

Cyclamen coum (Brambořík jarní)

synonyma: *Cyclamen apiculatum*, *Cyclamen brevifrons*, *C. f. albissimum*, *C. f. pallidum*, *C. subsp. hiemale*, *Cyclamen durostoricum*, *Cyclamen europaeum subsp. orbiculatum*, *Cyclamen hiemale*, *Cyclamen hyemale*, *Cyclamen kusnetzovii*, *Cyclamen orbiculatum*, *Cyclamen vernale*, *Cyclamen vernum var. hiemale*, *Cyclaminus coa*, *Cyclaminus coum*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Arménie, Balkánský poloostrov, Bulharsko, Černé moře, Česká republika, Írán, Izrael, Kavkaz, Krym, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Rumunsko, Rusko, Sýrie, V Středozeří

Roste u Černého moře, na Balkáně, v Turecku a Libanonu jako víceletka. Dorůstá výšky 3 - 10 (i 15)cm. Pod zemí vytváří zploštěle kulaté tmavěhnědé hlízky velikosti 0,5 - 1,5cm. Listy jsou kulatě ledvinovité, tmavězelené se stříbřitou kresbou, průměrem do 5cm a spodní strana je načervenalá. Květy jsou zpravidla tmavěružové (i bílé či růžovočervené), 5tičetné, korunní lístky jsou na bázi tmavší a dlouhé 0,8 - 1,4cm. Semeníky se spirálovitě stáčí a zavrtávají do země. Plodem je tobolka. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - listy zelené; květy bílé
- subsp. *causicum* - květy tmavěružové, na bázi červené
- subsp. *coum* - květy růžové až červené
- subsp. *elegans*
- 'Pewter Leaf Form' - listy stříbřitě šedé; květy růžové
- 'White Silver' - listy se stříbřitou kresbou; květy bílé

Vyhovuje mu polostín, dobře propustná vápenitá hlinitopísčité vždy alespoň vlhká půda. Nesnáší kyselé půdy. Na zimu je nutné důkladné zakrytí. Je mrazuvzdorný do -28°C.

Množí se semeny, které rozšiřují mravenci.

<https://www.rostliny.net/>