

Cyclamen hederifolium (Brambořík břechťanolistý)

synonyma: *Cyclamen aedirhizum*, *Cyclamen albiflorum*, *Cyclamen angulare*, *Cyclamen autumnale*, *Cyclamen crassifolium*, *Cyclamen cyclaminus*, *C. f. albiflorum*, *C. f. virgineum*, *C. subsp. crassifolium*, *C. subsp. romanum*, *C. var. poli*, *Cyclamen immaculatum*, *Cyclamen insulare*, *Cyclamen linearifolium*, *Cyclamen neapolitanum*, *Cyclamen poli*, *Cyclamen romanum*, *Cyclamen sabaudum*, *Cyclamen subhastatum*, *Cyclaminum vernum*, *Cyclaminus neapolitana*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Chorvatsko, Egejské ostrovy, Itálie, J Francie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Švýcarsko, V Středozeří

Roste ve východním středozeří jako trvalka. Pod zemí vytváří zploštělou hlízu o průměru až 12 (i 15)cm. Lisy jsou řapíkaté, tmavězelené se stříbřitou kresbu, zpravidla 5 - 9tilaločné, řídce mělce zubaté, objevují se na přelomu léta a podzimu a zatahují na konci jara. Kvete na podzim samostatnými bílými nebo narůžovělými či nafialovělými 5tičetnými květy, které vydrží až do silnějších mrazů na 6 - 12cm stopce, koruna je na bázi srostlá v krátkou trubky se zpětné ohnutými cípy, kde cípy jsou široce eliptické, špičaté, bleděružové, dlouhé 2cm a na bázi s krátkými oušky. Plodem je kulovitá tobolka na spirálově stočené stopce. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album' - bílé květy
- subsp. *confusum*
- subsp. *hederifolium* (Brambořík břechťanolistý pravý)

Vyhovují mu opadavé lesy, křoviny a vápenité půdy bohaté na živiny. Sází se do hloubky 15cm. Lze jej pěstovat i u nás venku na chráněném místě se zákryvem z listů nebo hlíny. Vhodné je místo pod listnáčem v polostínu až stínu v sušší dobře propustné hlinitopísčité půdě nebo listovce s vápenitým základem. Je mrazuvzdorný do -28°C. U nás dokáže se zákryvkou přezimovat.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>