

Cyclamen purpurascens (Brambořík nachový)

synonyma: *Cyclamen aestivum*, *Cyclamen breviflorum*, *Cyclamen clusii*, *Cyclamen cordifolium*, *Cyclamen cyclophyllum*, *Cyclamen deltoideum*, *Cyclamen europaeum*, *Cyclamen europaeum* var. *immaculatum*, *Cyclamen fatrense*, *Cyclamen floridum*, *Cyclamen hastatum*, *Cyclamen holochlorum*, *Cyclamen lilacinum*, *Cyclamen littorale*, *Cyclamen officinale*, *C. f. album*, *C. f. carmineolineatum*, *C. subsp. *immaculatum**, *Cyclamen retroflexum*, *Cyclamen rotundifolium*, *Cyclamen umbratile*, *Cyclamen variegatum*, *Cyclaminus europaea*, *Cyclaminus europaeus*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Česká republika, Francie, JZ Evropa, Kavkaz, Německo, Polsko, Rakousko, S Itálie, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, V Alpy, V Evropa, Z Karpaty

Jako jediný druh roste na sever od Alp jako stálezelená trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří kulovité korkovité hlízky. Listy jsou široce srdčité až kulaté, tmavězelené čepele s méně nápadnou stříbřitou kresbou, dlouze řapíkaté a spodní strana je červenofialová. Kvete samostatnými červenofialovými až růžovými aromatickými květy na dlouhých stopkách. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - květy bílé
- subsp. *maculatum* (Brambořík nachový fatranský)
- subsp. *purpurascens* (Brambořík nachový pravý)

Vyhovují mu stinné listnaté lesy, křoviny, atp. Půda by měla být lehká, kamenitá, vápnitá, bohatá na živiny.

<https://www.rostliny.net/>