

Lactuca dissecta

synonyma: *Chondrilla auriculata*, *Lactuca arvensis*, *Lactuca auriculata*, *Lactuca stocksii*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Austrálie, Indie, Irák, Írán, Jordánsko, Pákistán, Rusko, Turecko, Turkmenistán, Xizang (Tibet)

Roste v Turecku, Jordánsku, Iráku, Íránu, Rusku, Turkmenistánu, Afganistánu, Pákistánu, Indii a Tibetu jako jednoletka a zavlečená byla do Austrálie. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Stonek je větvený. Listy zpravidla vytvářejí přízemní růžici, jsou přisedlé, peřeně laločnaté až peřenosečné, obrysem obkopynaté až obvejčité, špičaté, dlouhé 9 - 15cm, široké 2 - 5cm, lodyžní listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 9cm a široké 0,5 - 2cm. Květenstvím je úbor délky 0,5 - 1,5cm, průměru 5mm na 0,7 - 2cm stopce, zákrov je 4 - 5řadý, dlouhý 1 - 1,5cm, zákrovní lístky špičaté, vnější dlouhé 1,5 - 3mm, široké 1,2mm, střední vejčité kopinaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 1 - 2mm, vnitřní čárkovité, dlouhé 1 - 1,4cm, široké 1 - 1,5mm a okvětních lístků je 15 - 20 v barvě modrofialové až růžově fialové. Plodem je tmavěhnědá nažka délky 2,5 - 3mm, šířky 1,3mm se zobákem délky 5 - 6mm a chmýrem délky 3mm.

<https://www.rostliny.net/>