

Lactuca undulata

synonyma: L. var. albicaulis, L. var. dentata, L. var. pinnatipartita, L. var. undulata, Lactucella undulata

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Arménie, Ázerbájdžán, Irák, Írán, Kavkaz, Kazachstán, Kypr, Kyrgyzstán, Libanon, Mongolsko, Pákistán, Palestina, Sinajský poloostrov, Sýrie, Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán, Xinjiang

Roste od Kypru po Čínu a Mongolsko jako jednoletka. Dorůstá výšky 8 - 25 (i 35)cm. Stonek může být větvený. Listy prakticky vytvářejí přízemní růžici, jsou obrysem eliptické až kopinaté, peřenosečné až peřenolaločnaté, špičaté, zubaté, dlouhé 4 - 6cm, široké 0,5 - 1cm, báze sbíhavá, lodyžní listy jsou přisedlé, kopinaté, dlouhé 3 - 4cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je válcovitý vzpřímený úbor délky 1 - 2,5cm, šířky 3 - 5mm, zákrov je 5 - 6třířadý, vnější zákrovní lístky jdou vejčitě kopinaté, dlouhé 4 - 6mm, široké 1 - 2mm, střední kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,2cm, široké 2 - 2,5mm, vnitřní čárkovité, dlouhé 1,8 - 2,6cm, široké 1mm, okvětních lístků je 12 - 18 a jsou modré. Plodem je žlutohnědá obkopinaté až obvejčitá zploštělá nažka s 1 rýhou délky 3 - 5mm, šířky 1,2mm, zobák má délku 0,8 - 1,3cm a chmýr je dlouhý 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>