

Iris kemaonensis

synonyma: *Iris duthiei*, *Iris kamaonensis*, *Iris kingiana*, *Iris tigrina*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Bhútán, Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sichuan, Sikkim, Uttarákhand, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Nepálu, Indii, Myanmaru a Pákistánu. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Pod zemí vytváří boulovatý oddenek. Listy jsou čárkovité, dlouhé 6 - 20 (za plodu 34 - 45)cm a široké 0,2 - 1cm. Stonek je zpravidla krátký. Květenství tvoří 2 - 3 zašpičatělé listeny délky 5 - 6cm, šířky 1,5 - 2cm, vlastní květy jsou růžově fialové, průměru 4 - 5 (i 8)cm, vnější korunní lístky jsou dlouhé 3,5 - 5cm, široké 1,5cm, hřebínek je bílý, vnitřní korunní lístky jsou obkopynaté, eliptické nebo obvejčité, dlouhé 4 - 5cm a široké 1cm. Plodem je prakticky přisedlá tobolka délky 2 - 2,5cm, šířky 1,5 - 1,8cm a obsahuje hruškovitá hnědočervená semena s béžovým o semením.

Vyhovuje mu dobře propustná půda s pH 6 - 7,5 či výše a plné slunce až částečný polostín. Odolává teplotám do -10°C až -15°C.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>