

Ficus rubiginosa

synonyma: *Ficus australis*, *Ficus baileyana*, *Ficus ferruginea*, *Ficus fulva*, *Ficus leichhardtii*, *Ficus leichhardtii* var. *angustata*, *Ficus macrophylla* var. *pubescens*, *Ficus microphylla*, *Ficus muelleri*, *Ficus novae-walliae*, *Ficus obliqua* var. *petiolaris*, *Ficus platypoda* var. *leichhardtii*, *Ficus platypoda* var. *mollis*, *Ficus platypoda* var. *petiolaris*, *Ficus platypoda* var. *subacuminata*, *F. f. glabrescens*, *F. var. glabrescens*, *F. var. lucida*, *Ficus shirleyana*, *Mastosuke rubiginosa*, *Perula rubiginosa*, *Urostigma ferrugineum*, *Urostigma leichhardtii*, *Urostigma muelleri*, *Urostigma rubiginosum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Havajské ostrovy, Kalifornie, Makaronésie, Nový Jižní Wales, Pákistán, Queensland, S Nový Zéland, Střední středozemí, Španělsko, Wake Island

Roste v Austrálii v podobě stromu s 1/2kulatou nebo široce kuželovitou hustou korunou a kmenem s opernými i vzdušnými kořeny a zavlečen byl i jinde. Dorůstá výšky 9 - 15 (i 50)m a téměř stejné šířky. Borka je tmavě šedá. Větve jsou strupovitě ochlupené, koncové pupeny dlouhé 2,5 - 5cm a hustě rezavě červeně ochlupené. Palisty jsou dlouhé do 12cm a na stejném stromě jsou různě dlouhé. Listy jsou široce eliptické, podlouhlé nebo vejčité (i obvejčité), tuhé, kožovité, tmavězelené, lesklé, obě strany jsou v mládí rezavě červené, dlouhé (6 -) 8 - 10 (i 17)cm, široké 4 - 8cm, žilnatinu tvoří (8 -) 10 - 12 (i 13) párů žilek a řapíky jsou dlouhé (1 -) 2 - 3 (i 4)cm. Plody bývají párovité, kulovité až mírně zploštělé, zelené nebo hnědožluté a široké 1 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Australis'/*F. australis* - listy jsou již v mládí holé, dlouhé do 8cm, široké 6cm
- 'Variegata'/var. *variegata* - bíložlutě panašované listy

<https://www.rostliny.net/>