

Hemionitis (Hemionka)

synonyma: Schizogramma

čeleď: Pteridaceae

Roste v tropické Asii a Americe v podobě stálezelené kapradiny. Listy jsou dlanitě až zpeřeně laločnaté, spodní úkrojky zvětšené a řapíkaté. Nejznámějším druhem je *H. palmata*.

Vyhovuje jí teplo a vlhko a bez problému snáší stín. Zálivka se ale provádí až po proschnutí substrátu.

Množí se výtrusy.

Hemionitis arifolia (Hemionka mukolistá)

synonyma: *Asplenium arifolium*, *Gymnogramma arifolia*, *Gymnogramma sagittata*, *H. cordata*, *H. cordifolia*, *H. sagittata*, *H. toxotis*, *Parahemionitis arifolia*

oblasti: Filipíny, Indie, Indočína, Malajsie, Srí Lanka

Roste v tropické Asii. Listy jsou tmavězelené, lesklé, kožovité, sterilní jsou srdčité s řapíkem délky 5 - 10cm, fertilní jsou střelovité a s řapíkem délky 30cm.

Hemionitis levyi

synonyma: *H. otonis*

Hemionitis palmata (Hemionka dlanitá)

synonyma: *Gymnogramme palmata*

oblasti: Jižní Amerika, Mexiko, Portoriko

Roste v Jižní a střední Americe v trsech. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Listy jsou dlanité, 5tilaločné, laloky jsou 3úhlé s mělce laločnatě pilovým okrajem.

Hemionitis pinnatifida

synonyma: *Gymnogramma pinnatifida*

Hemionitis rufa

synonyma: *Acrostichum rufum*, *Gymnogramma rufa*, *Gymnopteris rufa*, *Neurogramma rufa*, *Pteris rufa*

Hemionitis subcordata

synonyma: *Cheilanthes subcordata*, *Coniogramme americana*, *Coniogramme subcordata*, *Gymnogramma subcordata*, *Gymnopteris subcordata*

Hemionitis tomentosa

synonyma: *Asplenium tomentosum*, *Gymnogramma tomentosa*, *Gymnopteris tomentosa*

Hemionitis x smithii (Hemionka Smitova)

synonyma: *Dictyogramme smithii*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/asplenium-hemionitis/>

<https://www.rostliny.net/>