

Ficus americana (Fíkovník americký)

synonyma: *Ficus arbutifolia*, *Ficus chiriquiana*, *Ficus consanguinea*, *Ficus eugeniifolia*, *Ficus fadyeni*, *Ficus georgii*, *Ficus jacquinaefolia*, *Ficus jacquinifolia*, *Ficus liebmanniana*, *Ficus oerstediana*, *Ficus omphalophora*, *Ficus perforata*, *Ficus perforata* f. *roseiflora*, *Ficus periplocifolia*, *Ficus sintenisii*, *Ficus wilsonii*, *Urostigma arbutifolium*, *Urostigma chiriquianum*, *Urostigma consanguineum*, *Urostigma eugeniifolium*, *Urostigma liebmannianum*, *Urostigma oerstediana*

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Bolívie, Dominikánská Republika, Ekvádor, Florida, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, JV Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Návětrné ostrovy, Nikaragua, Panama, Peru, Portoriko, S Brazílie, Salvador, Střední Brazílie, Střední Mexiko, Surinam, SV Brazílie, SZ Brazílie, V Brazílie, Venezuela, Z Brazílie, Závětrné ostrovy

Roste v Karibiku, střední a Jižní Americe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 15 (i 30)m při průměru kmene až 1m. Obvykle jsou ale menší keřovité. Kmen vytváří v dolní části řídké vzdušné kořínky. Palisty jsou dlouhé 0,7 - 0,9 (i 2,5)cm. Listy jsou dlouhé 8 - 12cm, široké 4 - 6,5cm, téměř kožovité, eliptické až obvejčité, špičaté, zaoblené nebo tupé, báze bývá zúžená, bohatě jemně žilkovaná a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 0,5 (i 3)cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, kulovité, holé, zelené, řídce bíle až světlezeleně skvrnitě a v průměru mají do 7mm.

<https://www.rostliny.net/>