

Ficus aspera (Smokvoň draslavá)

synonyma: *Artocarpus cannonii*, *Artocarpus exculptus*, *Artocarpus laciniatus*, *F. f. parcellii*, *Ficus canonii*, *Ficus parcellii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Karibik, Návětrné ostrovy, Salvador, Tichý oceán, Závětrné ostrovy

Roste na Vanuatu v podobě opadavého nebo stálezeleného stromu a zavlečený byl do Salvadoru a Karibiku. Dorůstá výšky až 20m. Listy jsou peřeně laločnaté až hrubě zubaté, vroubkované nebo celokrajné, na horní straně mírně drsné, na spodní ochlupené, dlouhé do 32cm, široké 16cm, vejčité až eliptické, báze nestejná, postranní žilky vyniklé. Plody bývají kulovité, ochlupené, žluté, později červené a v průměru mají do 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cannonii'/*F. canonii*/*Artocarpus cannonii* - listy na horní straně bronzově červené, na spodní růžovofialové nebo červené, řapíky s centrálním žebrem červené; plody ve zralosti červené
- 'Parcelii'/*F. parcellii*/*f. parcellii* - výška až 3m; listy široce eliptické, béžovobíle až tmavě zeleně mramorované, tečkované až čárkované a na spodní straně ochlupené; plody ve zralosti růžové až růžovofialové

<https://www.rostliny.net/>