

Ficus aurea

synonyma: F. var. latifolia, Ficus cabusana, Ficus ciliolosa, Ficus cookii, Ficus dimidiata, Ficus isophlebia, Ficus jimenezii, Ficus laterisyce, Ficus lundellii, Ficus mayana, Ficus rigidula, Ficus sapotifolia, Ficus sororia, Ficus tecolutensis, Ficus tuerckheimii, Ficus venusta, Ficus warczewiczii, Urostigma tecolutense, Urostigma venustum, Urostigma warszewiczii

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Dominikánská Republika, Florida, Guatemala, Haiti, Honduras, J Mexiko, Jamajka, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kostarika, Kuba, Nikaragua, Panama, Salvador

Roste na Floridě, střední Americe a Karibiku v podobě poloopadavého stromu, někdy je i v mládí epifytický. Dorůstá výšky až 18 (i 20)m při průměru kmene do 1,2m. Borka je tlustá, téměř hladká, šedá. Větve jsou tlusté a holé. Listy jsou zpravidla tlusté, eliptické až podlouhlé, vejčité nebo obvejčité, tupé až špičaté, tmavězelené, dlouhé 10 - 17cm, široké 8cm, báze téměř špičatá až mírně srdčitá, spodní strana je světlejší, holá až drobně rezavá, centrální žebro na spodní straně vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1 - 6cm. Plody jsou přisedlé nebo vzácně krátce stopkaté, obvykle párovité, téměř kulovité až obvejčité, mírně ochlupené, v průměru mají 0,6 - 1,5cm, ve zralosti žluté, oranžovožluté nebo červené.

<https://www.rostliny.net/>