

Rubus baileyanus

synonyma: *Rubus flagellaris* var. *humifusus*, *Rubus housei*, *Rubus tenuicaulis*, *Rubus uniflorifer*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Connecticut, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA. Kmínky jsou 2leté, poléhavé, plazivé, dlouhé 1 - 2m a porostlé malými řídkými zahnutými ostny. Palisty jsou šídlovité, dlouhé 0,5 - 1cm. Listy jsou 3 (i 5)tičetné, řapíky i řapíčky řídce ostnitě, řapíky dlouhé 3 - 5cm, vlastní lístky jsou zašpičatělé, 2x pilovité se širokými 3úhlými zuby s hroty, oboustranně jemně ochlupené, centrální lístek je vejčitý, dlouhý 5 - 7cm, široký 4 - 6cm, báze je téměř srdčitá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek, řapíčky jsou dlouhé 1 - 2cm, postranní lístky jsou zkoseně široce vejčité, na fertilních větvích jsou listy (1 -) 3četné, centrální lístek je eliptický s řapíčkem délky 1cm, postranní jsou zkoseně vejčité a prakticky přisedlé. Kvete samostatnými květy v paždí horních listů nebo po 1 - 3ks na vrcholku, kališní lístky jsou vejčité s hrotem, ochlupené, dlouhé 5 - 6mm, korunní lístky jsou eliptické, bílé a dlouhé 1 - 1,4cm. Plody jsou černé, 1/2kulaté a průměru 1 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>