

Ficus citrifolia

synonyma: *Caprificus gigantea*, *Ficus antimanensis*, *Ficus botryapioides*, *Ficus brevifolia*, *Ficus caribaea*, *Ficus catesbaei*, *Ficus caucana*, *F. subsp. brevifolia*, *F. var. brevifolia*, *Ficus eximia f. paraguariensis*, *Ficus eximia var. cubensis*, *Ficus foveata*, *Ficus foveolata*, *Ficus gentlei*, *Ficus gigantea*, *Ficus guanarensis*, *Ficus guaranitica*, *Ficus laevigata*, *Ficus laevigata subvar. portoricensis*, *Ficus laevigata subvar. subcordata*, *Ficus laevigata subvar. subcuspidata*, *Ficus laevigata subvar. subdepressa*, *Ficus laevigata var. brevifolia*, *Ficus laevigata var. genuina*, *Ficus laevigata var. hispaniolae*, *Ficus laevigata var. lentiginosa*, *Ficus lentiginosa*, *Ficus lentiginosa var. imrayana*, *Ficus lentiginosa var. subcuspidata*, *Ficus oblongata*, *Ficus pedunculata*, *Ficus pedunculata var. acuta*, *Ficus planicostata*, *Ficus populifolia*, *Ficus populnea*, *Ficus populnea f. botryapioides*, *Ficus populnea subvar. cerasicarpa*, *Ficus populnea subvar. flavidosta*, *Ficus populnea subvar. floridana*, *Ficus populnea subvar. longipetiolata*, *Ficus populnea subvar. obliquicuspis*, *Ficus populnea subvar. portoricensis*, *Ficus populnea subvar. sancta-crucis*, *Ficus populnea subvar. sancti-eustachii*, *Ficus populnea subvar. subcuspidata*, *Ficus populnea var. bahamensis*, *Ficus populnea var. brevifolia*, *Ficus populnea var. hispaniolae*, *Ficus populnea var. laevigata*, *Ficus populnea var. lentiginosa*, *Ficus populoidea*, *Ficus populoidea f. syringifolia*, *Ficus populoidea f. umbrifera*, *Ficus populoidea var. dilatata*, *Ficus populoidea var. elongata*, *Ficus populoidea var. maculosa*, *Ficus portoricensis*, *Ficus pyrifolia*, *Ficus rectinervis*, *Ficus rubrinervis*, *Ficus ruiziana*, *Ficus sancti-crucis*, *Ficus subandina*, *Ficus syringifolia*, *Ficus thomaei*, *Ficus turbinata*, *Oluntos laevigata*, *Urostigma botryapioides*, *Urostigma giganteum*, *Urostigma laevigatum*, *Urostigma lentiginosum*, *Urostigma pedunculatum*, *Urostigma planicostatum*, *Urostigma populneum*, *Urostigma sanctae-crucis*, *Urostigma sancti-crucis*, *Urostigma syringifolium*

čeleď: Moraceae

oblasti: Florida, Jižní Amerika, Mexiko, Portoriko

Roste od jižní Floridy přes Karibik a Mexiko po Jižní Ameriku v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 16m při průměru kmene do 50cm. Vytváří i nepočetné vzdušné kořeny. Borka je nahnědlá. Větve jsou rozložité. Listy jsou holé, dlouhé 2,5 - 20cm, široké 1,5 - 12cm, kopinaté až vejčité či eliptické, špičaté, báze zaoblená, tupá až téměř srdčitá, centrální žebro na spodní straně vyniklé a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4cm. Plodí obvykle v párech, jsou kulovité až hruškovité, holé, žluté, později červené, někdy bíle skvrnité, v průměru mají do 1,2 (i 1,8)cm a mají 0,4 - 2cm stopku.

<https://www.rostliny.net/>