

## Ficus citrifolia

synonyma: *Caprificus gigantea*, *Ficus antimanensis*, *Ficus botryapioides*, *Ficus brevifolia*, *Ficus caribaea*, *Ficus catesbaei*, *Ficus caucana*, *F. subsp. brevifolia*, *F. var. brevifolia*, *Ficus eximia* f. *paraguariensis*, *Ficus eximia* var. *cubensis*, *Ficus foveata*, *Ficus foveolata*, *Ficus gentlei*, *Ficus gigantea*, *Ficus guanarensis*, *Ficus guaranítica*, *Ficus laevigata*, *Ficus laevigata* subvar. *portoricensis*, *Ficus laevigata* subvar. *subcordata*, *Ficus laevigata* subvar. *subcuspidata*, *Ficus laevigata* subvar. *subdepressa*, *Ficus laevigata* var. *brevifolia*, *Ficus laevigata* var. *genuina*, *Ficus laevigata* var. *hispaniolae*, *Ficus laevigata* var. *lentiginosa*, *Ficus lentiginosa*, *Ficus lentiginosa* var. *imrayana*, *Ficus lentiginosa* var. *subcuspidata*, *Ficus oblongata*, *Ficus pedunculata*, *Ficus pedunculata* var. *acuta*, *Ficus planicostata*, *Ficus populifolia*, *Ficus populnea*, *Ficus populnea* f. *botryapioides*, *Ficus populnea* subvar. *cerasicarpa*, *Ficus populnea* subvar. *flavicosta*, *Ficus populnea* subvar. *floridana*, *Ficus populnea* subvar. *longipetiolata*, *Ficus populnea* subvar. *obliquicuspis*, *Ficus populnea* subvar. *portoricensis*, *Ficus populnea* subvar. *sancta-crucis*, *Ficus populnea* subvar. *sancti-eustachii*, *Ficus populnea* subvar. *subcuspidata*, *Ficus populnea* var. *bahamensis*, *Ficus populnea* var. *brevifolia*, *Ficus populnea* var. *hispaniolae*, *Ficus populnea* var. *laevigata*, *Ficus populnea* var. *lentiginosa*, *Ficus populoides*, *Ficus populoides* f. *syringifolia*, *Ficus populoides* f. *umbrifera*, *Ficus populoides* var. *dilatata*, *Ficus populoides* var. *elongata*, *Ficus populoides* var. *maculosa*, *Ficus portoricensis*, *Ficus pyrifolia*, *Ficus rectinervis*, *Ficus rubrinervis*, *Ficus ruiziana*, *Ficus sancti-crucis*, *Ficus subandina*, *Ficus syringifolia*, *Ficus thomaea*, *Ficus turbinata*, *Oluntos laevigata*, *Urostigma botryapioides*, *Urostigma giganteum*, *Urostigma laevigatum*, *Urostigma lentiginosum*, *Urostigma pedunculatum*, *Urostigma planicostatum*, *Urostigma populneum*, *Urostigma sanctae-crucis*, *Urostigma sancti-crucis*, *Urostigma syringifolium*

čeleď: Moraceae

oblasti: Aruba, Belize, Bolívie, Dominikánská Republika, Ekvádor, Florida, Guatemala, Haiti, Honduras, J Brazílie, J Mexiko, Jamajka, JV Brazílie, JV Mexiko, JZ Brazílie, JZ Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Návětrné ostrovy, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, S Brazílie, Salvador, Střední Brazílie, Střední Mexiko, SV Argentina, SV Brazílie, SV Mexiko, SZ Brazílie, V Brazílie, V Mexiko, Venezuela, Z Brazílie, Závětrné ostrovy

Roste od jižní Floridy přes Karibik a Mexiko po Argentinu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 2 - 10 (i 16)m při průměru kmene do 50cm. Vytváří i nepočetné vzdušné kořeny. Borka je nahnědlá. Větve jsou rozložené. Palisty jsou úzce 3úhlé a dlouhé 0,5 -3cm. Listy jsou kopinaté až vejčité či eliptické, špičaté, dlouhé (1,5 -) 2,5 - 12 (i 20)cm, široké (1,5 -) 2,5 - 12 (i 20)cm, báze zaoblená, tupá až téměř srdčitá, centrální žebro na spodní straně vyniklé, žilnatinu tvoří 4 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4cm. Plodí obvykle v párech, jsou kulovité až hruškovité, holé, žluté, později červené, někdy bíle skvrnitě, v průměru mají do 1,2 (i 1,8)cm a mají 0,4 - 2cm stopku.

<https://www.rostliny.net/>