

Ficus cordata

synonyma: *Ficus atrovirens*, *F. var. marlothii*, *Ficus glaucophylla*, *Ficus rupium*, *Ficus tristis*, *Ficus welwitschii*, *Urostigma atrovirens*, *Urostigma glaucophyllum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Botswana, Kamerun, Kapsko, Namibie, Omán

Roste v Angole, Botswaně, JAR, Namibii, Kamerunu a v Ománu v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 (i 35)m, borka je světle šedá. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Listy jsou vejčité nebo srdčité, tmavě zelené, špičaté, oboustranně síťnatě žilkované, dlouhé 7cm, široké 3,5cm, báze srdčitá a řapíky jsou dlouhé (0,5 -) 2 - 5 (i 6)cm. Plodí v párech v paždí listů, plody jsou přisedlé, hnědé až nažloutlé, jemně sametové a v průměru mají 0,7 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Namaqua Rock Fig'

- subsp. *salicifolia*/*F. neriifolia*/*F. salicifolia*/*Urostigma salicifoli* - tropická Afrika; výška 1 - 15m; borka šedá, hladká nebo svrasklá; listy střídavé (i vstřícné), kopinaté, úzce vejčité, eliptické až podlouhlé, tupé až špičaté, kožovité, dlouhé 5 - 15 (i 20)cm, široké 1,5 - 7cm, báze zaoblená až téměř srdčitá, řapíky dlouhé 1,2 - 7cm; plody zelené až červené, kulovité, v paždí listů na max. 3mm stopce, široké 5 - 9mm

<https://www.rostliny.net/>