

# Ficus erecta

synonyma: *Ficus beecheyana*, *Ficus beecheyana* f. *koshunensis*, *Ficus beecheyana* f. *tenuifolia*, *Ficus cornifolia*, F. f. *koshunensis*, F. f. *sieboldii*, F. var. *beecheyana*, F. var. *sieboldii*, F. var. *yamadorii*, *Ficus japonica*, *Ficus koshunensis*, *Ficus maruyamensis*, *Ficus pseudopiriformis*, *Ficus pseudopyriformis*, *Ficus pumila*, *Ficus sieboldii*, *Ficus taquetii*, *Ficus taquetii*, *Ficus tenax*

čeleď: Moraceae

oblasti: Japonsko, Korea, Tchaj-wan

Roste v Koreji a ostrovech Tchaj-wan a Rjúkjú v podobě mnohokmenného rozkladitého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky do 4,5 - 7m. Borka je šedohnědá. Palisty jsou opadavé. Listy jsou obvejčité až dlouze kopinaté, dlouhé 7 - 20cm, široké 3 - 10cm, tlustě papírovité, spodní strana může být ochlupená, báze zaoblená až téměř srdčitá a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Plody jsou samostatné, červenožluté až červenorůžovofialové či červené, kulovité až hruškovité a v průměru mají 1 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *beecheyana*/var. *beecheyana* f. *koshunensis*/F. *beecheyana*/F. *beecheyana* var. *koshunensis*/F. *koshunensis* - strom nebo keř; výška 2 - 7m; větve hustě ochlupené; listy obvejčité eliptické až dlouze kopinaté, na spodní straně ochlupené, báze zaoblená až téměř srdčitá, konec zašpičatělý a řapíky dlouhé 1 - 4cm; plody samostatné, červenožluté až červenorůžovofialové, kulovité až hruškovité a v průměru mají 1 - 2,5cm

- var. *erecta*/F. *tenax* - keř; výška 3 - 4m; větve tlusté, téměř holé; listy obvejčité, špičaté, báze zaoblená až mělce srdčitá a řapíky dlouhé 1,5 - 4cm; plody samostatné, umístěné v paždí listů, červené, kulovité, holé, široké 1 - 1,5cm a mají 1 - 2cm stopku

<https://www.rostliny.net/>