

Symphyotrichum novi-belgii (Astríčka novobelgická)

synonyma: *Amellus divaricatus*, *Aster adulterinus*, *Aster argutus*, *Aster brumalis*, *Aster caespitosus*, *Aster floribundus*, *Aster laevigatus*, *Aster luxurians*, *Aster mutabilis*, *Aster novi-belgii* f. *roseus*, *Aster novi-belgii* subsp. *floribundus*, *Aster novi-belgii* subsp. *laevigatus*, *Aster novi-belgii* subsp. *stenolepis*, *Aster novi-belgii* var. *adulterinus*, *Aster novi-belgii* var. *ampliflorus*, *Aster novi-belgii* var. *atlanticus*, *Aster novi-belgii* var. *brittonii*, *Aster novi-belgii* var. *floribundus*, *Aster novi-belgii* var. *minor*, *Aster novi-belgii* var. *thyrsiflorus*, *Aster onustus*, *Aster onustus* var. *squarrosus*, *Aster serotinus*, *Aster thyrsiflorus*, *Aster thyrsiflorus* var. *squarrosus*, *Crinitaria humilis*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Jižní Karolína, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Dorůstá výšky 0,4 - 1,2m. Listy jsou střídavé a kopinaté. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 5 - 7mm. Plodem je nažka délky 2,5mm s chmýrem délky 4 - 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Fellowship'

<https://www.rostliny.net/>