

Ficus heterophylla

synonyma: *Ficus acutiloba*, *Ficus aquatica*, *Ficus biglandula*, *Ficus cannabina*, *Ficus denticulata*, *Ficus elongata*, *Ficus grossularioides* var. *subpanduriformis*, *F. var. scabrella*, *Ficus panduriformis*, *Ficus politoria*, *Ficus rufescens*, *Ficus scabrella*, *Ficus subpanduriformis*, *Ficus torteana*, *Ficus truncata*, *Urostigma subpanduriforme*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, Hainan, Jáva, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste od Indie a Číny po Indonésii v podobě poléhavého opadavého keře. Větve jsou krátce ochlupené. Palisty jsou téměř vejčité a blanité. Listy jsou vejčité kopinaté až široce vejčité, na mladých exemplářích zpeřeně laločnaté, dlouhé (5 -) 7 - 10 (i 14)cm, široké (1,5 -) 2,5 - 4 (i 5)cm, později špičaté, mohou být zubaté, dlouhé 2 - 10cm, široké 1,5 - 7cm, báze tupá, zaoblená nebo srdčitá, žilnatinu tvoří 4 - 8 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Plody samostatné, oranžovožluté, kulovité až hruškovité, v průměru mají 1 - 3cm a stopky jsou dlouhé 0,4 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>