

## Ficus hirta

synonyma: *Ficus hibiscifolia*, *F. var. appressa*, *F. var. brevipila*, *F. var. hibiscifolia*, *F. var. imberbis*, *F. var. integrifolia*, *F. var. palmatiloba*, *F. var. setosa*, *Ficus katsumadae*, *Ficus palmatiloba*, *Ficus porteri*, *Ficus setosa*, *Ficus simplicissima var. hirta*, *Ficus tridactylites*

čeleď: Moraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Indonésie, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie po Indonésii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 4m. Povrch je hnědě ochlupený. Palisty jsou červené, vejčité kopinaté a dlouhé 1 - 3cm. Listy jsou jednoduché nebo dlanité se 3 - 5ti laloky dlouhé 13 - 40cm, široké 8 - 34cm, zašpičatělé, báze srdčitá až široce klínovitá, horní strana drsná, spodní hustě ochlupená, okraj nepravidelně pilovitý a řapíky jsou dlouhé 1 - 15cm. Plodí v paždí v párech, jsou přisedlé, vejčité nebo kulovité, velké 1 - 4,5cm, hustě hnědě ochlupené a jedlé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brevipila* - listy obvejčité, dlouhé 8 - 16cm, široké 4,7 - 8,5cm celokrajné, zašpičatělé, na spodní straně hrubě krátce ochlupená, báze klínovitá; plody hustě ochlupené a v průměru mají 1,2 - 1,5cm

- var. *hirta*/var. *hibiscifolia*/var. *palmatiloba*/F. *hibiscifolia*/F. *katsumadai*/F. *palmatiloba*/F. *simplicifolia*  
var. *hirta* - listy elipticky kopinaté až široce vejčité, zákrovní listeny vejčité kopinaté, dlouhé 1 - 3cm a opadavé; samčí květy kulovité, samčí vejčitékulovité s průměrem 1 - 1,5cm

- var. *imberbis*/F. *tridactylites* - větve tlusté 1 - 5mm; listy dlouze eliptické, dlanitě laločnaté nebo jednoduché, okraj jemně pilovitý; zákrovní listeny dlouhé 1 - 5mm; plody téměř kulovité a holé, velké 1 - 2cm

- var. *roxburghii*/F. *hirstua*/F. *quangtrienensis*/F. *roxburghii* - větve dlouze hnědě hrubě ochlupené; listy dlanitě laločnaté, zákrovní listeny vejčité kopinaté, dlouhé 6 - 8mm; plody téměř kulovité s průměrem 2,5 - 3cm

<https://www.rostliny.net/>