

## Ficus hispida

synonyma: Covellia assamica, Covellia courtallensis, Covellia daemonum, Covellia dasycarpa, Covellia hispida, Covellia oppositifolia, Covellia setulosa, Covellia wightiana, Ficus caudiculata, Ficus compressa, Ficus daemonia, Ficus daemonum, Ficus fecunda, Ficus goolereea, Ficus heterostyla, F. f. borneensis, F. f. obovifolia, F. var. badiostrigosa, F. var. incana, F. var. viridis, Ficus hispidioides, Ficus letaqui, Ficus lima, Ficus mollis, Ficus oppositifolia, Ficus perinteregam, Ficus poilanei, Ficus prominens, Ficus sambucixylon, Ficus scabra, Ficus simphytifolia, Ficus symphytifolia, Gonosuke demonum, Gonosuke hispida, Gonosuke scaber, Sycomorphe roxburghii

čeleď: Moraceae

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Guangxi, Indonésie, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Guinea, Pákistán, S Austrálie, Sikkim, Srí Lanka, Vietnam

Roste od Číny po Austrálii a Novou Guineu v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky do 10 (i 15)m. Povrch je ochlupený. Borka je šedá. Palisty jsou vejčité kopinaté, dlouhé 1 - 2 (i 2,5)cm a na spodní straně ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité až podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, dlouhé (8 -) 10 - 30 (i 35)cm, široké (2,5 -) 5 - 20 (i 25)cm, špičaté až hrotité, tlusté, papírovité, celokrajné nebo tupět zubaté, na spodní straně šedě ochlupené, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, báze zaoblená až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 4 (i 10)cm. Plody v paždí listů, plody žluté nebo červené, obkuželovité a v průměru mají (1,2 -) 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. badiostrigosa/F. compressa/F. heterostyla - Guangxi, Vietnam; plody žluté, zploštěle kulovité, v průměru mají 2,5 - 3cm a stopky délky 0,5 - 1cm.
- var. hispida/F. letaqui/F. oppositifolia/F. sambucixylon/Covellia hispida/Covellia oppositifolia - Austrálie, jižní Asie, Malajsie až Nová Guinea
- var. rubra - Gunagxi, Vietnam; listy na spodní straně s plody černohnědí, hrubě ochlupené. Plody ve zralosti červené, v průměru dlouhé 1,2 - 1,5cm a stopky kratší než 5mm