

Ficus hispida

synonyma: *Covellia assamica*, *Covellia courtallensis*, *Covellia daemonum*, *Covellia dasycarpa*, *Covellia hispida*, *Covellia oppositifolia*, *Covellia setulosa*, *Covellia wightiana*, *Ficus caudiculata*, *Ficus compressa*, *Ficus daemona*, *Ficus daemonum*, *Ficus fecunda*, *Ficus goolereea*, *Ficus heterostyla*, *F. f. borneensis*, *F. f. obovifolia*, *F. var. badiostrigosa*, *F. var. incana*, *F. var. viridis*, *Ficus hispidioides*, *Ficus letaqui*, *Ficus lima*, *Ficus mollis*, *Ficus oppositifolia*, *Ficus perinteregam*, *Ficus poilanei*, *Ficus prominens*, *Ficus sambucixylon*, *Ficus scabra*, *Ficus simphytifolia*, *Ficus simphytifolia*, *Gonosuke demonum*, *Gonosuke hispida*, *Gonosuke scaber*, *Sycomorphe roxburghii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Guangxi, Hainan, Jáva, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Melanésie, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Guinea, Pákistán, Queensland, Severní teritorium, Sikkim, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Z Himálaj, Západní Austrálie

Roste od Číny po Austrálii a Novou Guineu v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky do 10 (i 15)m. Povrch je ochlupený. Borka je šedá. Palisty jsou vejčité kopinaté, dlouhé 1 - 2 (i 2,5)cm a na spodní straně ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčité až podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, dlouhé (8 -) 10 - 30 (i 35)cm, široké (2,5 -) 5 - 20 (i 25)cm, špičaté až hroťité, tlusté, papírovité, celokrajné nebo tupěť zubaté, na spodní straně šedě ochlupené, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, báze zaoblená až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 4 (i 10)cm. Plody v paždí listů, plody žluté nebo červené, obkruželovité a v průměru mají (1,2 -) 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *badiostrigosa*/*F. compressa*/*F. heterostyla* - Guangxi, Vietnam; plody žluté, zploštěle kulovité, v průměru mají 2,5 - 3cm a stopky délky 0,5 - 1cm.
- var. *hispida*/*F. letaqui*/*F. oppositifolia*/*F. sambucixylon*/*Covellia hispida*/*Covellia oppositifolia* - Austrálie, jižní Asie, Malajsie až Nová Guinea
- var. *rubra* - Gunagxi, Vietnam; listy na spodní straně s plody černohnědí, hrubě ochlupené. Plody ve zralosti červené, v průměru dlouhé 1,2 - 1,5cm a stopky kratší než 5mm

<https://www.rostliny.net/>