

Ficus laevis

synonyma: *Ficus ceylanica*, *Ficus emodi*, *Ficus jamini*, *F. var. assamica*, *F. var. dasyphylla*, *F. var. tomentosa*, *Ficus vagans*, *Ficus zeylanica*, *Pogonotrophe assamica*, *Pogonotrophe ceylanica*, *Pogonotrophe dasyphylla*, *Pogonotrophe emodi*, *Pogonotrophe laevis*, *Pogonotrophe vagans*, *Pogonotrophe wightiana*, *Pogonotrophe zeylanica*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, J Čína, Jáva, JV Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Srí Lanka, Sumatra, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste od Indie po Indočínu a Indonésie v podobě popínavého keře, epifytu nebo nízkého stromu. Povrch bývá holý. Palisty jsou dlouhé 0,8 - 1,2mm a opadavé. Listy vyrůstají ve spirále, jsou okrouhlé až široce vejčité, dlouhé 10 - 20 (i 29)cm, široké 8 - 15cm, celokrajné, holé, tupé nebo hroťité, na spodní straně hnědě ochlupené, báze zaoblená až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé (2 -) 3,5 - 7cm. Plodí po 1 - 2ks v paždí listů, v mládí jsou zelené, později červené, kulovité s průměrem 1,5 - 3cm a stopky jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Plody jsou párové, kulovité, průměru 1,5 - 2,5cm na 2 - 3cm stopce.

<https://www.rostliny.net/>