

Ficus lutea

synonyma: *Ficus akaie*, *Ficus apodocephala*, *Ficus arimensis*, *Ficus baronii*, *Ficus cabrae*, *Ficus holstii*, *Ficus incognita*, *Ficus kaba*, *Ficus lanigera*, *Ficus nautarum*, *Ficus nekbudu*, *Ficus neumanni*, *Ficus neumannii*, *Ficus pseudovogelii*, *Ficus quibeba*, *Ficus senegalensis*, *Ficus subcalcarata*, *Ficus subcalcarata* var. *vestito-bracteata*, *Ficus subcalcarata* var. *vestitobracteata*, *Ficus trichosphaera*, *Ficus utilis*, *Ficus verrucocarpa*, *Ficus vestito-bracteata*, *Ficus vestitobracteata*, *Ficus vogelii*, *Ficus vogelii* var. *pubicarpa*, *Ficus xanthophylla*, *Urostigma luteum*, *Urostigma neumannii*, *Urostigma vogelii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Benin, Burkina Faso, Čad, Čagoské ostrovy, Demokratická Republika Kongo (Zair), Etiopie, Gabon (Gabun), Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Madagaskar, Makaronésie, Malawi, Mali, Mosambik, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Portoriko, Rwanda, Salvador, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafriická Republika, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe v podobě stálezeleného rozkladitého stromu (i epifytu) a zavlečen byl na Madagaskar, ostrovy Indického oceánu a do Karibiku. Dorůstá výšky až 16 (i 30)m. Borka je šedohnědá. Větve jsou v mládí tlusté 0,5 - 2cm. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Listy vyrůstají ve spirále, jsou eliptické, podlouhlé až dlouze vejčité, zaoblené či krátce špičaté, dlouhé (7 -) 9 - 24 (i 45)cm, široké 4 - 15 (i 20)cm, báze zaoblená až srdčitá, povrch holý nebo ochlupený, žilnatinu tvoří (4 -) 6 - 10 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 12 (i 17)cm. Plodí v paždí listů nebo pod nimi, jsou přisedlé, žluté až oranžové, kulovité, široké 1,2 - 2cm, jemně ochlupené, bazální listeny vytrvávající a dlouhé 3 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>