

## Ficus microcarpa (Fíkovník maloplodý)

synonyma: *Ficus aggregata*, *Ficus amblyphylla*, *Ficus cairnsii*, *Ficus condaravia*, *Ficus dahlii*, *Ficus dictyophleba*, *Ficus dilatata*, *Ficus dyctiophleba*, *Ficus ginseng*, *Ficus littoralis*, *F. f. pubescens*, *F. var. crassifolia*, *F. var. fuyuensis*, *F. var. latifolia*, *F. var. naumannii*, *F. var. nitida*, *F. var. oluangpiensis*, *F. var. pusillifolia*, *Ficus naumannii*, *Ficus nitida*, *Ficus palcherii*, *Ficus palmeri*, *Ficus regnans*, *Ficus retusa*, *Ficus retusa f. parvifolia*, *Ficus retusa f. pubescens*, *Ficus retusa var. crassifolia*, *Ficus retusa var. nitida*, *Ficus retusa var. pisifera*, *Ficus retusiformis*, *Ficus rubra*, *Ficus thynneana*, *Ficus thynneana var. minor*, *Urostigma accedens var. latifolia*, *Urostigma amblyphyllum*, *Urostigma littorale*, *Urostigma microcarpum*, *Urostigma pisiferum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Alžírsko, Ásám, Bangladéš, Borneo, Dominikánská Republika, Egejské ostrovy, Filipíny, Florida, Hainan, Haiti, Havajské ostrovy, Irák, Itálie, Japonsko, Jáva, JV Čína, Kambodža, Lakadivské ostrovy, Laos, Makaronésie, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Marshallovy ostrovy, Myanmar (Barma), Návětrné ostrovy, Nepál, Nikaragua, Nová Kaledonie, Pákistán, Palestina, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Queensland, Salvador, Sicílie, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Španělsko, Tchaj-wan, Thajsko, Tunisko, V Himálaj, Venezuela, Vietnam, Z Himálaj

Roste v Indii, Japonsku, jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě bohatě větveného stálezeleného stromu a jinde byl zavlečený. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 30)m při průměru kmene 2 - 3m. Borka je šedá. Větve vytvářejí vzdušné kořínky, v mládí mohou být ochlupené a hnědé a konce jsou převíslé. Palisty jsou kopinaté a dlouhé 8mm. Listy jsou úzce až široce eliptické či vejčité až obvejčité, špičaté, tuhé, kožovité, tmavě zelené, lesklé, dlouhé (3 -) 5 - 10 (i 12)cm, široké (1,5 -) 2 - 5 (i 6)cm, báze klínovitá až zaoblená, žilnatinu tvoří 5 - 9 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Plody jsou kulovité, párovité, zploštělé, černé, přisedlé a široké (0,6 -) 0,8 - 1 (i 1,2)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Green Gem' - podobný 'Nitida', ale větší, pravidelnější a listy větší
- 'Hawaii' - pestré listy
- var. *hillii*/F. *hillii*/F. *schlechteri* - Queensland, Nová Kaledonie, Malajsie; listy dlouhé do 11cm, široké 6cm, báze klínovitá, bazální žilky méně vyniklé
- var. *latifolia*/F. *dictyophleba*/F. *thynneana*/F. *thynneana var. minor*/F. *thynneana var. typical*/Urostigma *accedens var. latifolium* - Queensland, Sulawesi, Moluky, Nová Guinea, Karolíny - listy široce eliptické až široce obvejčité, báze zaoblená až široce klínovitá, délky do 12cm a šířka 9cm
- var. *microcarpa* - Queensland; listy úzce eliptické až úzce obvejčité, dlouhé do 11cm, široké 6cm; báze klínovitá
- var. *naumannii* - plody krátce stopkaté
- var. *nitida* - vzpřímený hustý habitus
- 'Variegata' - malý; listy bílopestře

Je vhodný pro bonsajové pěstování.

<https://www.rostliny.net/>