

## Ficus microcarpa (Fíkovník maloplodý)

synonyma: *Ficus aggregata*, *Ficus amblyphylla*, *Ficus cairnsii*, *Ficus condaravia*, *Ficus dahlii*, *Ficus dictyophleba*, *Ficus dilatata*, *Ficus dyctiophleba*, *Ficus ginseng*, *Ficus littoralis*, *F. f. pubescens*, *F. var. crassifolia*, *F. var. fuyuensis*, *F. var. latifolia*, *F. var. naumannii*, *F. var. nitida*, *F. var. oluangpiensis*, *F. var. pusillifolia*, *Ficus naumannii*, *Ficus nitida*, *Ficus palcherii*, *Ficus palmeri*, *Ficus regnans*, *Ficus retusa*, *Ficus retusa f. parvifolia*, *Ficus retusa f. pubescens*, *Ficus retusa var. crassifolia*, *Ficus retusa var. nitida*, *Ficus retusa var. pisifera*, *Ficus retusiformis*, *Ficus rubra*, *Ficus thynneana*, *Ficus thynneana var. minor*, *Urostigma accedens var. latifolia*, *Urostigma amblyphyllum*, *Urostigma littorale*, *Urostigma microcarpum*, *Urostigma pisiferum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Irák, J Čína, J Indie, J Japonsko, Makaronésie, Malajsie, Nová Guinea, Nová Kaledonie, Pákistán, Portoriko, Queensland, Sicílie, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes)

Roste v Indii, jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě bohatě větveného stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 30)m při průměru kmene 2 - 3m. Borka je šedá. Větve vytvářejí vzdušné kořínky, v mládí mohou být ochlupené a hnědé a konce jsou převislé. Palisty jsou kopinaté a dlouhé 8mm. Listy jsou úzce až široce eliptické či vejčité až obvejčité, špičaté, tuhé, kožovité, tmavě zelené, lesklé, dlouhé (3 -) 5 - 10 (i 12)cm, široké (1,5 -) 2 - 5 (i 6)cm, báze klínovitá až zaoblená, žilnatinu tvoří 5 - 9 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Plody jsou kulovité, párovité, zploštělé, černé, přisedlé a široké (0,6 -) 0,8 - 1 (i 1,2)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Green Gem' - podobný 'Nitida', ale větší, pravidelnější a listy větší
- 'Hawaii' - pestré listy
- var. hillii/F. hillii/F. schlechteri - Queensland, Nová Kaledonie, Malajsie; listy dlouhé do 11cm, široké 6cm, báze klínovitá, bazální žilky méně vyniklé
- var. latifolia/F. dictyophleba/F. thynneana/F. thynneana var. minor/F. thynneana var. typical/Urostigma accedens var. latifolium - Queensland, Sulawesi, Moluky, Nová Guinea, Karolíny - listy široce eliptické až široce obvejčité, báze zaoblená až široce klínovitá, délky do 12cm a šířka 9cm
- var. microcarpa - Queensland; listy úzce eliptické až úzce obvejčité, dlouhé do 11cm, široké 6cm; báze klínovitá
- var. naumannii - plody krátce stopkaté
- var. nitida - vzpřímený hustý habitus
- 'Variegata' - malý; listy bílopestře

Je vhodný pro bonsajové pěstování.

<https://www.rostliny.net/>