

Ficus natalensis

synonyma: *Ficus columbarum*, *Ficus durbanii*, *Ficus mammosa*, *F. var. pedunculata*, *Ficus scutata*, *Ficus subacuminata*, *Ficus thonningii*, *Ficus variabilis*, *Ficus variabilis f. obtusifolia*, *Ficus variabilis f. subacuminata*, *Ficus volkensii*, *Urostigma natalense*

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Kamerun, Karibik, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Malawi, Mali, Mosambik, Namibie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Středoafričká Republika, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe v podobě stálezeleného stromu nebo epifytu a zavlečený byl na Trinidad a Tobago. Dorůstá výšky 5 - 30m. Listy vrstvují ve spirále, jsou eliptické nebo obvejčité, tupé, zaoblené či krátce špičaté, dlouhé (2,5 -) 3 - 10cm, široké (1 -) 1,5 - 4,5cm, holé, báze špičatá, klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 6 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Plody v paždí listů nebo pod nimi, jsou dlouhé 0,2 - 1cm, jsou žluté nebo červené, kulovité, holé, široké 0,8 - 1,8cm a bazální listeny opadavé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *leptophylla*/F. *leptophylla*/F. *triangularis* - Zambie až Senegal; listy široce obvejčité až eliptické, plody malé
- subsp. *natalensis*
- "Variegata"
- "Westland" - vzpřímený habitus; listy převislé, v mládí světlezelené, později tmavší

<https://www.rostliny.net/>