

Ficus nervosa

synonyma: *Ficus blinii*, *Ficus bullata*, *Ficus modesta*, *F. var. longifolia*, *F. var. minor*, *Ficus undulata*, *Urostigma modestum*, *Urostigma nervosum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Filipíny, Hainan, Jáva, Laos, Malé Sundry, Melanésie, Myanmar (Barma), Nepál, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tchaj-wan, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste od Indie po Čínu, Indočínu, Filipíny a Indonésii v podobě stromu. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou eliptické až obvejčitě kopinaté, dlouhé 6 - 20cm, široké 2,5 - 8cm, kožovité, tmavě zelené, lesklé, tupé až dlouze zašpičatělé, na spodní straně tmavé, báze zaoblená až klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,2cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, objevují se v paždí listů, jsou kulovité, v průměru mají 1 - 1,5cm a stopky jsou hladké, dlouhé 0,7 - 1,3cm.

<https://www.rostliny.net/>