

## Ficus obliqua

synonyma: *Ficus aphanoneura*, *Ficus australis*, *Ficus backhousei*, *Ficus booshiana*, *Ficus boothiana*, *Ficus elegans*, *Ficus eugenoides*, *Ficus graeffei*, *Ficus graeffii*, *Ficus laevis*, *Ficus sororia*, *Ficus tryoni*, *Ficus tryonii*, *Ficus virginea*, *Urostigma backhousei*, *Urostigma eugenoides*, *Urostigma obliquum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Nová Kaledonie, Nový Jižní Wales, Papua-Nová Guinea, Queensland, Sulawesi (Celebes), Tichý oceán, Západní Austrálie

Roste v Tichomoří, Austrálii a Sulawesi v podobě stromu občas se vzdušnými kořeny. Dorůstá výšky 15 - 30m. Listy jsou střídavé, holé, téměř kožovité, eliptické tupé až špičaté, dlouhé do 15cm, široké 6cm a báze je někdy zúžená. Plody jsou párovité, stopkaté, kulovité až obvejčité, obvykle holé, v mládí zelené, tečkované a v průměru mají až 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *obliqua* - Sulawesi, Tichý oceán, Austrálie; listy eliptické, báze klínová a řapíky dlouhé 1 - 1,5cm; plody široké 6 - 9mm a mají stopky délky 0 - 4mm
- var. *petiolaris*/F. *platypoda* var. *petiolaris* - Queensland, Nový Jižní Wales; listy eliptické, báze klínovitá až zaoblená a řapíky jsou dlouhé do 5cm; plody široké 1 - 1,5cm, stopky dlouhé do 1cm
- var. *puberula*/F. *eugenoides* var. *puberula* - Západní Austrálie; listy elipticky kopinaté, řapíky dlouhé 3- 5mm; plody široké 5 - 6mm a stopky dlouhé 0 - 4mm

<https://www.rostliny.net/>