

Ficus platypoda

synonyma: *Ficus leucotricha*, *Ficus leucotricha* var. *megacarpa*, *Ficus leucotricha* var. *sessilis*, *Urostigma leucotrichum*, *Urostigma platypodum*, *Urostigma vitellinum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Indonésie, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě obvykle vícekmenného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou holé, kopinaté až vejčité či eliptické, tuhé, tmavězelené, lesklé, dlouhé 6 - 10cm, široké 1 - 7cm a řapíky široké a tlusté, dlouhé 2cm. Samčí květy mají 4 - 5 červenohnědých cípů, lůžko je téměř přisedlé, kulovité, o průměru 0,6 - 1,2cm a hladké. Plody jsou holé, v průměru mají 1 - 1,5cm, bazální listeny 3, drobné, holé a stopky dlouhé do 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustata*/var. *mollis*/var. *subacuminata*/F. *leichhardtii*/F. *leichhardtii* var. *angustata*/F. *muelleri*/F. *shirleyana*/*Urostigma leichhardtii*/*Urostigma muelleri* - listy vejčité až eliptické, báze klínovitá až zaoblená, kožovitá, z obou stran sametová a řapíky s mladými větvemi jsou ochlupené
- var. *cordata* - Západní Austrálie a Indonésie; listy široce vejčité, kožovité, báze srdčitá nebo zaoblená, holá nebo řídce ochlupená
- var. *lachnocaula*/F. *lachnocaula*/*Urostigma lachnocaulon* - Západní Austrálie, Queensland; listy vejčité až eliptické, holé, kožovité, na spodní straně sametová, báze klínovitá až zaoblená
- var. *minor*/*Urostigma platypodum* f. *glabrior* - Jižní Austrálie, Queensland a Západní Austrálie; listy úzce vejčité až úzce eliptické, holé, široké 1 - 4cm, báze klínovitá
- var. *platypoda* - Západní Austrálie, Queensland; větve holé; palisty mírně ochlupené; listy eliptické až široce vejčité, široké 3 - 7cm, báze bývá zaoblená

<https://www.rostliny.net/>