

Ficus racemosa

synonyma: *Covellia glomerata*, *Covellia lanceolata*, *Covellia mollis*, *Ficus acidula*, *Ficus chittagonga*, *Ficus glomerata*, *Ficus glomerata* var. *chittagonga*, *Ficus glomerata* var. *elongata*, *Ficus glomerata* var. *miquelii*, *Ficus glomerata* var. *mollis*, *Ficus goolereea*, *Ficus henrici*, *Ficus lanceolata*, *Ficus leucocarpa*, *Ficus lucescens*, *Ficus mollis*, *F. var. elongata*, *F. var. miquelii*, *F. var. mollis*, *F. var. racemosa*, *F. var. vesca*, *Ficus semicostata*, *Ficus trichocarpa* f. *glabrescens*, *Ficus vesca*, *Urostigma leucocarpum*, *Urostigma lucescens*

čeleď: Moraceae

oblasti: Bangladéš, Indie, Indonésie, J Čína, Malajsie, Myanmar (Barma), Nová Guinea, Pákistán, S Austrálie, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste od Indie přes Indonésii po Austrálii v podobě stálezeleného (i opadavého) stromu. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 35)m při obvodu kmene až 3m. Může vytvářet vzdušné kořeny. Borka je šedohnědá a hladká. Větve jsou v mládí hnědé a hustě jemně bíle ochlupené. Palisty jsou vejčitě kopinaté, ochlupené a dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou eliptické až vejčitě kopinaté, zašpičatělé až tupé, tenké kožovité, dlouhé (5 -) 6 - 18 (i 20)cm, široké (2,5 -) 3 - 9 (i 12)cm, na spodní straně světlezelené, v mládí ochlupené, báze klínovitá až tupá, okraj celokrajný a řapíky jsou dlouhé 2 - 7 (i 7,5)cm. Plody jsou červenooranžové, hruškovité, v mládí ochlupené a v průměru mají 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *miquelii*/F. *glomerata* var. *chittagonga*/F. *glomerata* var. *miquelii*/F. *chittagonga* - Yunnan, Indie, Myanmar, Vietnam; mladé větve, listy a říčky hustě bíle ochlupené
- var. *racemosa*/var. *vesca*/F. *glomerata*/F. *semicostata*/F. *vesca*/Covellia *glomerata* - Srí Lanka, jižní Čína, jihovýchodní Asie po Novou Guineu a Austrálie - mladé větve, listy a říčky hustě ochlupené, chlupy zahnuté

<https://www.rostliny.net/>