

Ficus racemosa

synonyma: Covellia glomerata, Covellia lanceolata, Covellia mollis, Ficus acidula, Ficus chittagonga, Ficus glomerata, Ficus glomerata var. chittagonga, Ficus glomerata var. elongata, Ficus glomerata var. miquelii, Ficus glomerata var. mollis, Ficus goolereea, Ficus henrici, Ficus lanceolata, Ficus leucocarpa, Ficus lucescens, Ficus mollis, F. var. elongata, F. var. miquelii, F. var. mollis, F. var. racemosa, F. var. vesca, Ficus semicostata, Ficus trichocarpa f. glabrescens, Ficus vesca, Urostigma leucocarpum, Urostigma lucescens

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, J Čína, Jáva, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Guinea, Pákistán, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Yunnan, Z Himálaj, Západní Austrálie

Roste od Indie přes Indonésii po Austrálii v podobě stálezeleného (i opadavého) stromu. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 35)m při obvodu kmene až 3m. Může vytvářet vzdušné kořeny. Borka je šedohnědá a hladká. Větve jsou v mládí hnědé a hustě jemně bíle ochlupené. Palisty jsou vejčitě kopinaté, ochlupené a dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou eliptické až vejčitě kopinaté, zašpičatělé až tupé, tence kožovité, dlouhé (5 -) 6 - 18 (i 20)cm, široké (2,5 -) 3 - 9 (i 12)cm, na spodní straně světle zelené, v mládí ochlupené, báze klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 4 - 7 (i 8) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 7 (i 7,5)cm. Plody jsou červenooranžové, hruškovité, v mládí ochlupené a v průměru mají 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. miquelii/F. glomerata var. chittagonga/F. glomerata var. miquelii/F. chittagonga - Yunnan, Indie, Myanmar, Vietnam; mladé větve, listy a lístky hustě bíle ochlupené
- var. racemosa/var. vesca/F. glomerata/F. semicostata/F. vesca/Covellia glomerata - Srí Lanka, jižní Čína, jihovýchodní Asie po Novou Guineu a Austrálii - mladé větve, listy a lístky hustě ochlupené, chlupy zahnuté

<https://www.rostliny.net/>