

Ficus rumphii

synonyma: *Ficus affinior*, *Ficus conciliorum*, *Ficus cordifolia*, *Ficus coriacea*, *Ficus damit*, *Ficus populiformis*, *Ficus populnea*, *Urostigma cordifolium*, *Urostigma rumphii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Jáva, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sudy, Melanésie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, S Indie, Sulawesi (Celebes), SZ Indie, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste v Číně, Indii, Nepálu, Andamanech, Nikobarech, Indočíně, Jávě, Malých Sundách, Molukách a Sulawesi v podobě stromu nebo epifytu. Dorůstá výšky 15 - 20m při obvodu kmene do 1,5m. Palisty jsou vejčité kopinaté, opadavé a dlouhé 1,2 - 2,5cm. Listy jsou široce vejčité, 3úhlé nebo kosočtvercovité, dlouhé (8 -) 10 - 16 (i 20)cm, široké (5 -) 6 - 10 (i 12)cm, celokrajné, zvlněné, holé, zašpičatělé (špička dlouhá 1 - 2cm), báze uťatá (i srdčitá či klínovitá) s 3 - 5ti žilkami, žilnatinu tvoří 5 (i 7) párů žilek a řapíky jsou dlouhé (4 -) 5 - 9 (i 10)cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, umístěné v paždí listů, kulovité, zelené, později načernalé, v mládí světle tečkované a široké (1 -) 1,2 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>