

Ficus stuhlmannii

synonyma: Ficus homblei, Ficus howardiana

čeleď: Moraceae

oblasti: Botswana, Demokratická Republika Kongo (Zair), Keňa, KwaZulu-Natal, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Tanzánie, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Ugandě, Malawi, Mosambiku, Zambii, Zimbabwe, Botswaně, JAR, Svazijsku a Demokratické Republice Kongo v podobě stromu, někdy i epifytu. Dorůstá výška až 10 (i 15)m. Větve jsou v mládí široké 4 - 8mm. Palisty jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Listy vyrůstají ve spirále, jsou podlouhlé, eliptické, obvejčité nebo vejčité, zaoblené, tupé či krátce špičatý, jemně ochlupené, dlouhé 3 - 18cm, široké 3 - 8cm, báze zaoblená až téměř srdčitá, žilnatinu tvoří (3 -) 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 4cm. Plody přisedlé, růžové nebo růžovofialové, kulovité nebo eliptické, široké 0,7 - 1,8cm, ochlupené a vytvářejí se v paždí listů.

<https://www.rostliny.net/>