

Ficus superba

synonyma: *Ficus petiolata*, *Ficus tenuipes*, *Ficus timorensis*, *Ficus wightiana*, *Urostigma accedens*, *Urostigma superbum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Čína, Indie, Japonsko, Jáva, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Melanésie, Myanmar (Barma), Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko

Roste od Číny a Japonska po jihovýchodní Asii a Moluky v podobě velkého stromu se vzdušnými kořeny. Listy jsou v mládí růžové, později zelené, eliptické, dlouhé do 25cm, široké do 13cm a báze je zaoblená nebo téměř srdčitá. Plody jsou svazčité, stopkaté, hruškovité, matné, růžově fialové a v průměru mají do 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *henneana*/*F. gracilipes*/*F. henneana*/*F. parkinsonii*/*F. pritzelii* - menší; větve v mládí široké do 6mm; listy široké do 10cm

- var. *japonica*/*F. geniculate* var. *abnormalis* - Čína, Japonsko, Malajsie, Myanmar a Thajsko; opadavý strom; borka červeně hnědá; větve světle červené; palisty kopinaté, dlouhé 2cm; listy eliptické až podlouhlé, dlouhé 10 - 15cm, široké 4 - 6cm, papírovité, krátce zašpičatělé, řapíky dlouhé 3 - 7mm; plody samostatné až párovité, růžově fialově černé, zploštěle kulovité, široké 5 - 8mm

<https://www.rostliny.net/>