

Ficus tinctoria

synonyma: *Ficus altimeraloo*, *Ficus altimeraloo* var. *laeta*, *Ficus antoniana*, *Ficus chlorosykon*, *Ficus excelsa*, *Ficus fenicis*, *Ficus laeta*, *Ficus michelii*, *Ficus neoebudarum*, *Ficus neoehudarum*, *Ficus reticulosa*, *Ficus swinhoei*, *F. subsp. swinhoei*, *F. subsp. tinctoria*, *F. var. neoehudarum*, *Ficus validinervis*, *Urostigma excelsum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Filipíny, Gilbert Islands, Hainan, Jáva, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Laos, Liniové ostrovy, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Marshallovy ostrovy, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Kaledonie, Papua-Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tchaj-wan, Thajsko, Tuamotu, Tuvalu, V Himálaj, Vietnam, Z Čína, Západní Austrálie

Roste od jižní Číny po Austrálii a Polynésii v podobě epifytického keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 10m. Palisty jsou šídlovitě kopinaté, tuhé a dlouhé 0,5 - 1cm. Listy jsou eliptické až téměř kosočtvercovité, tupé až špičaté, dlouhé 3 - 13 (i 18)cm, široké (2,5 -) 3 - 6 (i 8)cm, báze široce klínovitá až téměř srdčitá, žilnatina je na spodní straně vyniklá s 5 - 8mi páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, kulovité až hruškovité, velké 0,5 - 1,2cm a stopky jsou dlouhé do 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *gibbosa*/F. *gibbosa*/F. *gibbosa* var. *rigida*/F. *michelii* - Čína, Malajsie, Indonésie, Myanmar, Thajsko; strom nebo epifyt; listy vejčitě eliptické až téměř kosočtvercovité, dlouhé do 13cm, široké do 5cm (u epifytu větší), asymetrické, celokrajné nebo zubaté; plody o průměru 6 - 8mm

- subsp. *parasitica*/F. *cuspidifera*/F. *gibbosa* var. *cuspidifera*/F. *gibbosa* var. *parasitica*/F. *parasitica*/F. *pseudobotryoides*/F. *rhomboidalis* - Čína, Indie, Bhútán, Myanmar, Nepál, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam; epifyt; listy větší, téměř kožovité; plody kulovité o průměru 1 - 7mm, kalich bílý a červený

- subsp. *swinhoei*/F. *swinhoei* - Tchaj-wan, Filipíny; poléhavý keř; listy eliptické, kožovité, tupé, dlouhé 3 - 7cm, široké 2,5 - 3,5cm, báze téměř srdčitá; plody téměř kulovité, o průměru 8mm, stopky dlouhé 1 - 2mm

- subsp. *tinctoria* - Tchaj-wan, Indonésie, Filipíny, Austrálie, Nová Guinea; epifyt, později nízký strom; listy eliptické, tenké kožovité, holé, tupé až špičaté, celokrajné, dlouhé 8 - 13cm, široké 4 - 6cm, báze široce klínovitý; plody samostatné až párovité, kulovité až kulovitě hruškovité o průměru 1cm

<https://www.rostliny.net/>