

Ficus variegata

synonyma: Covellia racemifera, Ficus agusanensis, Ficus amboinensis, Ficus cerifera, Ficus ceriflua, Ficus chlorocarpa, Ficus compressitora, Ficus cordifolia, Ficus domestica, Ficus ehretioides, Ficus garciae, Ficus glochidiifolia, Ficus gummiflua, Ficus ilangoides, Ficus integrifolia, Ficus konishii, Ficus laevigata, Ficus latsoni, Ficus latsonii, Ficus paucinervia, Ficus racemifera, Ficus subopaca, Ficus subracemosa, Ficus sum, Ficus sycomoroides, Ficus tenimbreensis, F. f. paucinervia, F. f. rotundata, F. var. chlorocarpa, F. var. garciae, F. var. ilangoides, F. var. pilosior, F. var. sycomoroides, Ficus viridicarpa, Sycomorus gummiflua, Urostigma javanicum

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, Filipíny, Hainan, Japonsko, Jáva, JV Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Melanésie, Myanmar (Barma), Papua-Nová Guinea, Queensland, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie po Austrálii v podobě stromu s hustou kulatou korunou. Dorůstá výšky 7 - 15 (i 25)m. Borka je šedá až šedě hnědá. Palisty jsou vejčité kopinaté a dlouhé 1 - 1,5cm. Listy jsou vejčité až eliptické, tupé až špičaté, holé, celokrajné (na mladých větvích hrubě zubaté), dlouhé do 32cm, široké 15cm, báze zaoblená až uťatá, mělce srdčitá, spodní strana v mládí kolem žilek jemně ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 6,8cm. Plody svazčité, kulovité až hruškovité, sametové až holé, bledě zelené, žluté nebo růžovočervené a široké do 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chlorocarpa/F. chlorocarpa - Čína; výška do 15m; borka šedá; listy celokrajné, řapíky dlouhé 5 - 6,8cm; plody zelené až žluté
- var. greciae/F. greciae/F. konishii - Japonsko, Čína, Indonésie, Filipíny; listy špičaté, žilnatinu tvoří 7 - 14 párů žilek; plody zploštěle kulovité, zelené, bíle tečkové, široké 2 - 3,5cm

<https://www.rostliny.net/>