

Ficus virens

synonyma: *Ficus aegiophylla*, *Ficus ampla*, *Ficus carolinensis*, *Ficus caulobotrya* var. *fraseri*, *Ficus cunninghamii*, *Ficus fraseri*, *Ficus glabella*, *Ficus glabella* f. *grandifolia*, *Ficus glabella* var. *nesophila*, *Ficus infectoria* var. *aegiophylla*, *Ficus infectoria* var. *cunninghamii*, *Ficus infectoria* var. *forbesii*, *Ficus infectoria* var. *fraseri*, *Ficus infectoria* var. *lambertiana*, *Ficus infectoria* var. *psychotriifolium*, *Ficus infectoria* var. *wightiana*, *Ficus infrafoliacea*, *Ficus lacor* var. *cunninghamii*, *Ficus lacor* var. *lambertiana*, *Ficus lambertiana*, *Ficus monticola*, *Ficus nesophila*, *Ficus nitentifolia*, *Ficus pilhasi*, *Ficus prolixa* var. *carolinensis*, *Ficus psychotriifolia*, *Ficus saxophila* var. *sublanceolata*, *Ficus scandens*, *Ficus terminalioides*, *Ficus terminalis*, *Ficus timorensis*, *F. var. glabella*, *F. var. sublanceolata*, *F. var. wightiana*, *Ficus wightiana*, *Urostigma aegiophyllum*, *Urostigma apiculatum*, *Urostigma canaliculatum*, *Urostigma cunninghamii*, *Urostigma fraseri*, *Urostigma glabellum*, *Urostigma infectorium*, *Urostigma lambertiana*, *Urostigma lambertianum*, *Urostigma moritzianum*, *Urostigma nesophilum*, *Urostigma perseaeifolium*, *Urostigma psychotriifolium*, *Urostigma timorense*, *Urostigma wightianum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, Filipíny, Hainan, Jáva, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Kaledonie, Nový Jižní Wales, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Tichý oceán, V Čína, V Himálaj, Vietnam, Z Čína, Západní Austrálie

Roste v jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě stromu se širokou korunou nebo epifytu, zpravidla s 1 kmenem. Dorůstá výšky 15 (i 30)m při obvodu kmene 1,5 - 2,5m. Větve vytváří mnoho vzdušných kořenů. Borka je šedá. Palisty jsou vejčité kopinaté, špičaté, ochlupené a dlouhé 1 - 1,5cm. Listy jsou vejčité nebo eliptické, zašpičaté, lesklé, dlouhé 8 - 18 (i 20)cm, široké (3 -) 3,5 - 8 (i 9)cm, báze klínovitá nebo zaoblená, 3žilná, žilnatinu tvoří (5 -) 7 - 10 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé (2,5 -) 3 - 6,5 (i 8)cm. Plody jsou párovité, téměř kulovité, bílé s červenými skvrnami, široké (0,7 -) 1,2 - 1,5 (i 2)cm, bazální listeny 3, dlouhé 1,5- 5mm a široké 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dasycarpa* - Západní Austrálie; plody stopkaté, hustě bíle ochlupené
- var. *sublanceolata*/F. *caulobotrya* var. *fraseri*/F. *cunninghamii*/F. *fraseri*/F. *infectoria* var. *cunninghamii*/F. *infectoria* var. *fraseri*/F. *infectoria* var. *psychotriifolia*/F. *psychotriifolia*/F. *saxophila* var. *sublanceolata*/Urostigma *cunninghamii*/Urostigma *fraseri*/Urostigma *psychotriifolium* - listy úzce kopinaté, zašpičaté, dlouhé do 20cm; plody přisedlé
- var. *virens* - Západní Austrálie, Queensland, jižní Asie; listy vejčité kopinaté až elipticky vejčité, dlouhé 10 - 15cm, široké 4 - 7cm, holé, plody stopkaté a holé

<https://www.rostliny.net/>