

Crassula connata

synonyma: *C. var. connata*, *Crassula erecta*, *Crassula minima*, *Crassula tillaea*, *Tillaea connata*, *Tillaea diffusa*, *Tillaea erecta*, *Tillaea erecta subsp. eremica*, *Tillaea erecta var. eremica*, *Tillaea leptopetala*, *Tillaea minima*, *Tillaea minima var. subsimplex*, *Tillaea rubescens*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Arizona, Bolívie, Britská Kolumbie, Ekvádor, Guatemala, J Argentina, J Čile, J Mexiko, Kalifornie, Kolumbie, Oregon, Peru, S Argentina, S Čile, Střední Čile, SV Argentina, SZ Argentina, SZ Mexiko, Uruguay, V Mexiko, Washington

Roste od západu Severní Ameriky po jih Jižní Ameriky jako vzpřímená jednoletka. Dorůstá výšky 2 - 6 (i 10)cm. Stonky jsou časem červené. Listy jsou vejčité až podlouhlé, špičaté nebo zakulacené a dlouhé 1 - 3 (i 6)mm. Květenství je kompaktní, vlastní (3 -) 4 (i 5)tičetné květy mají 0,2 - 6mm stopku, kališní lístky kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 2mm, korunní lístky jsou úzce 3úhlé a dlouhé 0,6 - 1,5mm. Plodem je vystoupavý vejčitý měchýřek obsahující 1 - 2 eliptická semena délky 0,3 - 0,6mm a šířky 0,1 - 0,3mm.

<https://www.rostliny.net/>