

# Crassula tillaea

synonyma: Crassula muscosa, Mesanchum connatum, Sedum tillaei, Tillaea muscosa, Tillaea procumbens

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Egejské ostrovy, Francie, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Makedonie, Maroko, Německo, Nizozemí, Oregon, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Saudská Arábie, Selvagens, Sicílie, Střední Čile, Tunisko, Turecko, Uruguay, Velká Británie, Washington

Roste ve středomoří, na sever po Velkou Británii, na východ po Turecko a Saudskou Arábii jako jednoletka, zavlečená byla do Čile, Uruguaye a Severní Ameriky. Dorůstá výšky 3 - 5 (i 8)cm. Stonek je vzpřímený a časem červenající. Listy jsou podlouhlé, špičaté a dlouhé 1 - 3mm. Květenství je kompaktní, vlastní květy jsou 3 (i 4)četné, mají 0,2 - 0,5 (i 1,5)mm stopku, kališní lístky kopinaté, zašpičatělé, délky 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou úzce kopinaté a dlouhé 0,5 - 1mm. Plodem je vystoupavý vejčitý měchýřek obsahující (1 -) 2 eliptická semena délky 0,3mm a šířky 0,2mm.

<https://www.rostliny.net/>