

Hierochloe odorata (Tomkovice vonná)

synonyma: Anthoxanthum hirtum, Anthoxanthum nitens, Avena odorata, Dimesia fragrans, Hierochloe arctica, Hierochloe baltica, Hierochloe borealis, Hierochloe borealis var. fragrans, Hierochloe fragrans, Hierochloe hirta, Hierochloe hirta subsp. arctica, Hierochloe hirta subsp. praetermissa, Hierochloe hirta var. annulata, Hierochloe nashii, H. f. eamesii, H. subsp. arctica, H. subsp. baltica, H. subsp. fragrans, H. subsp. hirta, H. subsp. kolymensis, H. subsp. praetermissa, H. var. annulata, H. var. fragrans, H. var. pubescens, Holcus arcticus, Holcus borealis, Holcus fragrans, Holcus odoratus, Poa nitens, Savastana hirta, Savastana nashii, Savastana odorata, Savastana odorata var. fragrans, Torresia nashii, Torresia odorata

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Irsko, Island, Itálie, Katalánsko, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Rhode Island, Rusko, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skotsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Vermont, Yukon

Jedná se o aromatickou bylinu vyskytující se v severní Euroasii a na severu Severní Ameriky. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 60 (i 80)cm. Listy jsou ale dlouhé až 1m nebo i více, jejich báze je ukrytá pod zemí, je široká, bílá (může být i červenofialová v závislosti na zemi), bez ochlupení a spodní strana je světlejší. Květenstvím je kuželovitá symetrická lata tvořené 20 - 100 klásky, klásky mohou mít krátce řídce ochlupenou stopku, vrchol pluchy horních samčích květů je hrotitý a osina obvykle chybí. Patří mezi kriticky ohrožené druhy C1.

Vyhovuje ji plné slunce a hlinitopísčité vlhčí půdy. Je mrazuvzdorná do -34°C.

<https://www.rostliny.net/>