

Persicaria (Rdesno)

synonyma: Rubrivena

čeleď: Polygonaceae

Persicaria acuminata

synonyma: Chulusium acuminatum, Polygonum acuminatum, Polygonum acuminatum var. brachystemon, Polygonum acuminatum var. capense, Polygonum acuminatum var. glabrescens, Polygonum acuminatum var. humboldtii, Polygonum acuminatum var. microstemon, Polygonum acuminatum var. setigerum, Polygonum acuminatum var. subcordatum, Polygonum acuminatum var. weddellii, Polygonum alfredi, Polygonum bettfreundianum, Polygonum cuspidatum, Polygonum erectum, Polygonum floribundum, Polygonum guatemalense, Polygonum setigerum

oblasti: Palestina

Patří mezi polokeře. Dorůstá výška do 1m. Stonky jsou vzpřímené nebo vystoupavé, ale dokáží se také plazit po vodní hladině a dokáží také znova zakořenit. Listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 25cm a široké 2 - 4cm. Květenství je klasnaté, dlouhé 4 - 11cm a široké 0,5 - 1cm. Plodem je tmavě hnědá nažka průměru 2mm.

Persicaria alpina

synonyma: Aconogonon alaskanum, Aconogonon alaskanum subsp. hultenianum, Aconogonon alaskanum var. glabrescens, Aconogonon alpinum, Aconogonon alpinum var. stewartii, Gonococcus undulatus, P. undulata, Pleuropteropyrum alpinum, Pleuropteropyrum jeholense, Pleuropteropyrum undulatum, Polygonum alaskanum, Polygonum alaskanum var. glabrescens, Polygonum alpinum, Polygonum alpinum subsp. alaskanum, Polygonum alpinum var. alaskanum, Polygonum jeholense, Polygonum weyrichii var. alpinum

oblasti: Afganistán, Aljaška, Altaj, Apeniny, Chorvatsko, Čína, Himálaj, J Karpaty, JV Evropa, Kašmír, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán, Pyreneje, S Indie, Španělsko, Turkestán, V Alpy, V Karpaty, Z Alpy

Roste v chladnějších místech Severní Ameriky, Evropy a Asie v podobě trvalky. Dorůstá výšky (0,3-) 0,7 - 1,2 (i 1,8)m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Stonky jsou vystoupavé až vzpřímené, chudě větvené a rýhované. Listy jsou kopinaté, tmavězelené, na okraji ochlupené, přízemní s řapíky délky 1,5 - 8mm, na vrcholu stonku přisedlé a mají délku 5 - 13 (i 15)cm a šířku 1 - 3,5cm. Květenstvím je bohatá lata, vlastní květy jsou 5tičetné, žlutobílé nebo narůžovělé, 5tičetné, v průměru mají 3 - 5mm, korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 3 (i 3,5)mm a široké 0,8 - 1,5mm. Oddenek se používá v lidovém léčitelství.

Vyhovují mu vlhké horské louky a pastviny, okraje lesů, atp. s půdou s kyselým pH.

Persicaria amphibia (Rdesno obojživelné)

synonyma: Chulusium amphibium, Chulusium fluitans, Chulusium natans, P. amphibia var. emersa, P. amphibia var. natans, P. amphibia var. stipulacea, P. amphibia var. terrestris, P. amurensis, P. coccinea, P. hartwrightii, P. muhlenbergii, Polygonum amphibium, Polygonum amphibium subsp. laevimarginatum, Polygonum amphibium var. amurense, Polygonum amphibium var. emersum, Polygonum amphibium var. muehlenbergii, Polygonum amphibium var. natans, Polygonum

amphibium var. *stipulaceum*, *Polygonum amphibium* var. *terrestre*, *Polygonum amphibium* var. *vestitum*, *Polygonum amurense*, *Polygonum coccineum*, *Polygonum coccineum* var. *pratincola*, *Polygonum coccineum* var. *rigidulum*, *Polygonum emersum*, *Polygonum hartwrightii*, *Polygonum muhlenbergii*, *Polygonum natans*, *Polygonum pusporium*, *Polygonum rigidulum*

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Bhútán, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Finsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Island, Itálie, J Afrika, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kašmír, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Xizang (Tibet), Z Asie, Západní Virginie

Roste v chladnějších částech severní polokoule. Ve vodě dorůstá délky až 3m, na suchu je vystoupaté, dlouhé do 50cm, listy jsou rozložené na hladině a kořeny ukotvené na dně. Listy jsou kopinaté až podlouhlé, zašpičatěle špičaté, kožovité, tmavě zelené, lesklé, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 4cm, báze srdcítá nebo uťatá a řapík má délku 4 - 10cm. Květenství (objevuje se zpravidla pouze ve vodě) je vzpřímené, kuželovité, klasnaté, husté, dlouhé 0,8 - 3cm, tvořené růžovými (i bílými) 5tičetnými květy s 5ti tyčinkami, korunní lístky jsou ve 2 řadách, dlouhé 2 - 2,5mm a široké 1,5 - 2mm. Plodem je 3mm černě hnědá lesklá vejčitá až kulatá nažka délky 2,5 - 3,3mm a šířky 1,5 - 2mm.

Vyhovují ji stojatější vody, rybníky, slepá ramena atp. Za rok dokáže vyrůst i 1m. Dokáže ale růst i na suchu.

Uzliny lodyh dobře zakořeňují na dně. Množí se semeny nebo právě oddenky.

Persicaria amplexicaulis

synonyma: *Bistorta amplexicaulis*, *Bistorta amplexicaulis* subsp. *sinensis*, *Bistorta amplexicaulis* subsp. *sinomontana*, *Bistorta amplexicaulis* var. *alba*, *Bistorta amplexicaulis* var. *dhorpatanensis*, *Bistorta amplexicaulis* var. *pendula*, *Bistorta henryi*, *Bistorta oxyphylla*, *Bistorta petiolata*, *Bistorta sinomontana*, *Bistorta sinomontana* var. *pubifolia*, *Bistorta speciosa*, *Polygonum amplexicaule*

oblasti: Irsko

Vytváří trsy. Pod zemí vytváří silné dužnaté oddenky, kterými se rozrůstá do šířky. Květenství je dlouhé 6 - 10cm, barvy květů jsou bílé, růžové až červené.

Vyžaduje vlhké půdy. Mladší rostliny na zimu raději zakryjte např. listím.

Persicaria arcuata

synonyma: *Polygonum arcuatum*

Persicaria arifolia

synonyma: *Polygonum arifolium*, *Polygonum arifolium* var. *lentiforme*, *Tracaulon arifolium*, *Truellum arifolium*

Persicaria attenuata

synonyma: *Polygonum attenuatum*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *attenuata*
- subsp. *pulchra*

Persicaria barbata

synonyma: *P. omerostroma*, *Polygonum barbatum*, *Polygonum kotoshoense*, *Polygonum omerostromum*

oblasti: Pákistán, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii a Pákistánu jako jednoletka. Stonek je vzpřímený. Dorůstá délky 30 - 60 (i 75)cm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 15cm, široké 0,25 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 6)mm. Květenstvím je bohatý hrozen délky 5 - 10cm s 1 - 6ti klasy na každém rameni, stopka má délku 0,5 - 3 (i 5)cm, vlastní květy jsou 5tičetné, bílé, průměru 1 - 2mm, mají 0,75 - 1,5mm stopku, korunní lístky jsou obkopinatě obvejčité, zašpičatělé, 2řadé, nestejně, dlouhé 0,75 - 1,25cm a široké 1,5 - 2,5mm. Plodem je 3hranná černá nažka délky 1,8 - 2 (i 2,25)mm a šířky 1,2 - 1,5mm.

Persicaria bicornis

synonyma: *P. longistyla*, *Polygonum bicorne*, *Polygonum longistylum*

Persicaria bistorta

synonyma: *Bistorta abbreviata*, *Bistorta carnea*, *Bistorta elliptica*, *Bistorta ensigera*, *Bistorta lapidosa*, *Bistorta major*, *Bistorta major* subsp. *carnea*, *Bistorta major* subsp. *cordifolia*, *Bistorta major* subsp. *elliptica*, *Bistorta major* subsp. *ensigera*, *Bistorta major* subsp. *nitens*, *Bistorta major* subsp. *plumosa*, *Bistorta major* var. *ovata*, *Bistorta major* var. *pacifica*, *Bistorta nitens*, *Bistorta officinalis*, *Bistorta officinalis* subsp. *japonica*, *Bistorta officinalis* subsp. *pacifica*, *Bistorta pacifica*, *Bistorta pacifica* f. *velutina*, *Bistorta pacifica* var. *tomentella*, *Bistorta plumosa*, *Bistorta subauriculata*, *Bistorta vulgaris* var. *nitens*, *Bistorta vulgaris* var. *pacifica*, *Colubrina intorta*, *Polygonum bistorta*, *Polygonum bistorta* subsp. *plumosum*, *Polygonum bistorta* var. *plumosum*, *Polygonum bistortoides*, *Polygonum lapidosum*, *Polygonum plumosum*

oblasti: Irsko, Čína

Persicaria brittingeri (Rdesno skvrnité)

synonyma: *P. lapathifolia* subsp. *brittingeri*

oblasti: Česká republika

Persicaria bungeana

synonyma: *Polygonum bungeanum*, *Polygonum chanetii*, *Polygonum pensylvanicum*

Persicaria caespitosa

Persicaria campanulata

synonyma: *Aconogonon campanulatum*, *Aconogonon campanulatum* var. *oblongum*, *Polygonum campanulatum*, *Reynoutria campanulata*

oblasti: Irsko

Persicaria capitata (Rdesno hlavaté)

synonyma: *Cephalophilon capitatum*, *Polygonum capitatum*

oblasti: Austrálie, Čína, Havajské ostrovy, Havajské ostrovy, J Afrika, Japonsko, Kalifornie, Kalifornie, Louisiana, Louisiana, Makaronésie, Myanmar (Barma), Nepál, Oregon, Oregon, Pákistán, S Indie, S Indie, V Himálaj

Roste v Indii a Himálaji, dále ve východní Asii, Austrálii nebo Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 50)cm. Povrch je řídce žláznatě ochlupený. Stonky jsou plazivé. Listy jsou střídavé, široce vejčité, zašpičatělé až špičaté, pilovitě zubaté, růžově až červeně hnědě skvrnité či pruhované, na okraji ochlupené, dlouhé 1 - 3,5 (i 5)cm, široké 0,75 - 2,5 (i 3)cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 7,5mm. Květenstvím je hustá vrcholová vejčitá hlávka na 1 - 4cm stopce, délky 1 - 2cm, šířky 0,7 - 1,8cm, vlastní květy jsou růžové, 5tičetné, průměru 0,5 - 1,25mm, má 1mm stopku, korunní lístky jsou obkopinaté, zašpičatělé a 3žilné. Plodem je 3hranná tmavě hnědá nažka délky 1 - 2mm a šířky 0,5 - 0,75mm. Vydává nepříjemné aroma podobající se močovině.

V příhodných podmínkách se může stát plevelem. Vyhovuje mu teplo, polostín, vlhké a půda bohatá na živiny.

Persicaria chinensis

synonyma: *Polygonum chinense*

oblasti: Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Japonsko, Myanmar (Barma), Pákistán, Srí Lanka

Roste v Indii, Bhútánu, Myanmu, Číně, Japonsku, Filipínách, Srí Lance a Pákistánu jako vzpřímená křovitě větvený polokeř. Dorůstá výšky do 1m. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce vejčité, čárkovité nebo 3úhle vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, báze bývá uťatá, zpravidla se 2ma laloky a řapíky jsou dlouhé 4 - 9mm. Květenstvím je složený stopkatý okolík, vlastní 5tičetné květy mají 1mm stopku, průměr 2 - 3,5mm, korunní lístky jsou kopinaté, špičaté, bílé nebo růžové, dlouhé 2,5 - 4mm a široké 1,25 - 1,5mm. Plodem je 3úhlá nažka délky 2 - 3 (i 4)mm a šířky 1,5 - 2mm.

Persicaria cliopolitana

synonyma: *Polygonum cliopolitanum*

Persicaria decipiens

synonyma: *Polygonum decipiens*

oblasti: Itálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Palestina, Queensland, Severní teritorium,

Tasmánie, Tichý oceán, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii a na Norfolku jako trvalky. Dorůstá výšky 0,6 - 1,2m. Stonek je vzpřímený, větvený, může být i poléhavý a dokáže znovu zakořenit. Listy jsou přisedlé, úzce kopinaté až prakticky čárkovité, špičaté, dlouhé 6 - 15cm, široké 0,5 - 2cm a na bázi kulaté až srdčité. Květenství je klasnaté, bohaté a dlouhé 1,5 - 8cm. Plodem je nažka délky 2 - 3mm v barvě tmavohnědé až načernalé.

Persicaria dichotoma

synonyma: *P. peduncularis*, *Polygonum dichotomum*, *Polygonum pedunculare*, *Polygonum strigosum* var. *pedunculare*, *Polygonum tetragonum*, *Tracaulon pedunculare*, *Tracaulon tetragonum*, *Truellum dichotomum*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium

Roste v Austrálii.

Persicaria dubia

synonyma: *Polygonum dubium*

oblasti: Itálie

Persicaria elatior

synonyma: *Polygonum elatius*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Persicaria ferruginea

synonyma: *Polygonum ferrugineum*, *Polygonum gummifera*, *Polygonum spectabile*, *Polygonum spectabile* var. *minor*

Persicaria filiformis

synonyma: *Polygonum filiforme*

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Persicaria foliosa

synonyma: *Polygonum foliosum*

Persicaria glabra

synonyma: *P. densiflora*, *P. portoricensis*, *Polygonum densiflorum*, *Polygonum glabrum*, *Polygonum mexicanum*, *Polygonum portoricense*, *Polygonum segetum* var. *verrucosum*

oblasti: Afrika, Filipíny, Jižní Austrálie, Malajsie, Pákistán, Queensland

Roste v Austrálii, tropické Asii a Africe v podobě vzpřímené větvené trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Stonek je na bázi červené. Listy jsou kopinaté, zašpičatělé, občas na bázi červeně tečkované, dlouhé 18 - 22cm, široké 1 - 3,5cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,35cm. Květenstvím je stopkatý větvený hrozen délky 5 - 10cm, vlastní 5tičetné bílé nebo růžové květy mají 2,5 - 4,5mm stopku a korunní lístky jsou dlouhé do 2,5mm. Plodem je černá zakulacená nažka délky 1,5 - 3mm a šířky 1,5 - 2mm.

Persicaria glandulopilosa

synonyma: *Polygonum glandulopilosum*

Persicaria glomerata

synonyma: *Polygonum glomeratum*, *Truellum glomeratum*

Persicaria hirsuta

synonyma: *Polygonum hirsutum*

Persicaria hispida

synonyma: *Polygonum hispidum*

Persicaria hybrida

synonyma: *Polygonum hybridum*

Persicaria hydropiper (Rdesno peprník)

synonyma: *P. hydropiper* var. *diffusa*, *P. hydropiper* var. *vulgaris*, *P. vernalis*, *Polygonum hydropiper*, *Polygonum hydropiper* var. *longistachyum*, *Polygonum hydropiper* var. *projectum*, *Polygonum hydropiper* var. *vulgare*, *Polygonum koreense*, *Polygonum schinzii*

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, S Indie, Severní Dakota, Severní Karolína, Slovensko, Středozemí, SZ Afrika, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste na severní polokouli jako jednoletka nebo trvalka. Dorůstá výšky (0,08 -) 0,15 - 0,7 (i 1)m. Stonky jsou vzpřímené až vystoupavé, mohou být rozvětvené, holé, zelené až načervenalé či nařízlavělé. Listy jsou kopinaté, zašpičatělé, zpravidla zvlněné, obvykle má tmavou skvrnu, dlouhé (1,5 -) 2 - 8 (i 10)cm, široké (0,4 -) 1 - 1,5 (i 3)cm, spodní strana je ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je zpravidla převislý klas délky 3 - 7cm na 1 - 6,5cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, růžové, průměru 1 - 2mm, dlouhé 3 - 4mm, mají 0,5 - 1,25mm stopku, korunní lístky jsou obvejčité, zašpičatělé, červeně tečkované, dlouhé 1 - 3mm a široké 0,75 - 1,5mm. Plodem je

zpravidla 3hranná lesklá tmavě hnědá až černá nažka délky (2-) 2,5 - 3,5 (i 4)mm a šířky 1,5 - 2mm.

Vyhovuje mu vlhko.

Persicaria hydropiperoides

synonyma: *P. hydropiperoides* var. *opelousana*, *P. hydropiperoides* var. *setaceum*, *P. opelousana*, *P. paludicola*, *Polygonum hydropiperoides*, *Polygonum hydropiperoides* var. *adenocalyx*, *Polygonum hydropiperoides* var. *breviciliatum*, *Polygonum hydropiperoides* var. *opelousanum*, *Polygonum hydropiperoides* var. *psilostachyum*, *Polygonum opelousanum*, *Polygonum opelousanum* var. *adenocalyx*

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Persicaria hystricula

Persicaria jucunda

Persicaria lanata

oblasti: Indie, Malajsie, Myanmar (Barma), Pákistán

Roste v Pákistánu, Indii, Malajsii a Myanmaru v podobě vzpřímené až vystoupavé jednoletky. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5m. Stonek může být větvený a zejména v kolénkách bývá načervenalý a ochlupený. Listy jsou kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 5 - 15cm, široké 0,8 - 2,5cm a řapíky jsou dlouhé do 3mm. Květenstvím je stopkatý hrozen délky 2,5 - 5 (i 6)cm, vlastní květy jsou 4 (i 5)tičetné, dlouhé 2,5mm a korunní lístky jsou červené nebo bílé. Plodem ne 2laločná plochá černá nažka délky 2mm a šířky 1,8 - 2mm.

Persicaria lanigera

synonyma: *P. lapathifolia* var. *lanigera*, *Polygonum lanigerum*, *Polygonum lapathifolium* var. *lanigerum*

oblasti: Egypt, Izrael, Kréta, Palestina

Roste jako polokeř. Dorůstá výšky 0,8 - 1,6m. Stonky jsou vzpřímené, větvené a spodní dokáží znova zakořenit. Listy jsou krátce řapíkaté, kopinaté, špičaté, ochlupené, dlouhé do 25cm a široké 2 - 7cm. Květenství je klasnaté a dlouhé 2 - 7,5cm. Plodem je prakticky černá nažka.

Persicaria lapathifolia (Rdesno blešník)

synonyma: *Dioctis maculatum*, *Dioctis vernum*, *Discolenta lapathifolia*, *Discolenta scabra*, *P. attenuata* subsp. *pulchra*, *P. hypanica*, *P. lapathifolia* subsp. *andrzejowskiana*, *P. lapathifolia* subsp. *brittingeri*, *P. lapathifolia* subsp. *hypanica*, *P. lapathifolia* subsp. *klokovii*, *P. lapathifolia* subsp. *linicola*, *P. lapathifolia* subsp. *pallida*, *P. lapathifolia* subsp. *saporoviensis*, *P. lapathifolia* var. *incana*, *P. lapathifolia* var. *linicola*, *P. lapathifolia* var. *nodosa*, *P. lapathifolia* var. *tomentosa*, *P. linicola*, *P.*

oneillii, *P. saporoviensis*, *P. scabra*, *P. scabra* var. *incana*, *P. tomentosa*, *Peutalis nodosa*, *Polygonum andrzejowskianum*, *Polygonum brittingeri*, *Polygonum ferrugineum* var. *patagonicum*, *Polygonum glandulosum*, *Polygonum hypanicum*, *Polygonum incanum*, *Polygonum incarnatum*, *Polygonum lapathifolium*, *Polygonum lapathifolium* f. *nodosum*, *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*, *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*, *Polygonum lapathifolium* var. *icanum*, *Polygonum lapathifolium* var. *nodosum*, *Polygonum lapathifolium* var. *ovatum*, *Polygonum lapathifolium* var. *salicifolium*, *Polygonum linicola*, *Polygonum mariae*, *Polygonum nodosum*, *Polygonum nodosum* var. *icanum*, *Polygonum pallidum*, *Polygonum pensylvanicum* subsp. *oneillii*, *Polygonum persicaria* var. *icanum*, *Polygonum persicaria* var. *vernicosum*, *Polygonum saporoviense*, *Polygonum scabrum*, *Polygonum spectabile* var. *patagonica*, *Polygonum tomentosum*, *Polygonum utriculatum*

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, J Asie, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, V Asie, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste na severní polokouli a Jižní Americe jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 0,6 (i 1,5)m. Stonky jsou vzpřímené až plazivé, zpravidla v uzlinách rozvětvené, občas ochlupené, zelené až načervenalé, často černě skvrnité. Listy jsou vstřícné, umístěné zejména ve spodní části, kopinaté až vejčité, špičaté, zvlněné, ochlupené, mívají tmavou skvrnu ve tvaru 1/2měsíce, dlouhé (1,5 -) 3 - 10 (i 15)cm, široké (0,5 -) 1 - 3 (i 4)cm a báze klínovitá. Květenstvím je vzpřímený nebo převislý stopkatý klas délky (1 -) 2 - 7 (i 8)cm, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, růžové nebo nazelenalé, průměru 2 - 2,5 (i 3)mm, mají max. 0,5 - 1 (i 1,5)mm stopku, korunní lístky jsou nestejně, mírně obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 2mm a široké 0,75mm. Plodem je srdčitá tmavě hnědá lesklá 2laločná nažka délky 2 - 2,5 (i 3,5)mm a šířky 1,5 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *brittingeri*/*Polygonum brittingeri*/*Persicaria brittingeri* (Rdesno blešník skvrnité) - listy jsou široce vejčité až okrouhlé, dlouhé 1,5 - 5cm
- subsp. *danubiale*
- subsp. *lapathifolia*/*Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorpha* (Rdesno blešník pravé) - lodyha je červeně skvrnitá, lysá nebo plstnatá; husté květenství; červené plody délky 2 - 2,5mm
- subsp. *pallida*/*Polygonum tomentosum*/*Persicaria tomentosa* (Rdesno blešník bledé) - může být lysá i plstnatá; husté žluté květenství široké 0,8 - 1,4cm

Vyskytuje se na březích vodních toků, obnažená dna rybníků, vzácně i ve vodě. Má rád půdy bohaté na živiny.

Persicaria laxiflora

oblasti: Irsko

Persicaria laxmannii

synonyma: *Aconogonon ochreatum* var. *laxmannii*, *Pleuropteropyrum laxmannii*, *Polygonum laxmannii*

Persicaria limbata

synonyma: *Polygonum limbatum*, *Polygonum piliferum*, *Polygonum schinzii*

Persicaria longiseta

synonyma: *Polygonum caespitosum* var. *longisetum*, *Polygonum longisetum*

oblasti: Čína, Japonsko, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán

Roste v Kašmíru, Nepálu, Myanmu, Číně a Japonsku jako jednoletka. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupatý, nahnědlý až červeně hnědý a od báze větvený. Listy jsou kopinatě eliptické, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 2,5 - 12cm, široké 0,75 - 3,5cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenství je přerušované, dlouhé 0,8 - 4cm, vlastní 5tičetné květy mají průměr do 2mm na 1mm stopce, korunní lístky jsou nestejné, červené, růžové nebo bělavé a vejčité nebo obvejčité. Plodem je 3hranná černá nažka.

Persicaria maculata

synonyma: *Polygonum maculatum*

Persicaria maculosa (Rdesno červivec)

synonyma: *P. fusiformis*, *P. maculosa* var. *argentea*, *P. mitis*, *P. persicaria*, *P. salicifolia*, *Polygonum biforme*, *Polygonum fusiforme*, *Polygonum persicaria*, *Polygonum persicaria* var. *ruderale*, *Polygonum puritanorum*, *Polygonum ruderale*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Himálaj, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Středozemí, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste na severní polokouli v podobě jednoletky. Dorůstá výšky 0,1 - 1,2m. Stonek je vzpřímený až plazivý, rozvětvený hnědý a může být načervenalý. Listy jsou vejčité až kopinaté, špičaté, mívá na tobě skvrnu ve tvaru půlměsíce, dlouhé (1-) 2 - 14 (i 16)cm, široké (0,25-) 1 - 3,5 (i 4)cm, báze je klínovitá, spodní strana může být ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je vzpřímený nebo převislý stopkatý klas délky 2 - 3 (i 7)cm na 1 - 2cm stopce, vlastní 5tičetné květy jsou tmavě růžově červené, dlouhé 2 - 3mm, průměru 1,5 - 2mm. Plodem je hrotitá zploštělá tmavě hnědá až černá lesklá nažka délky (1,8-) 2 - 2,25 (i 2,5)mm a šířky 1,5mm.

Persicaria madagascariensis

synonyma: *P. attenuata* subsp. *africana*, *Polygonum madagascariense*, *Polygonum poiretii* var. *madagascariense*, *Polygonum poiretii* var. *madagascariensis*

oblasti: Madagaskar

Persicaria meisneriana

synonyma: *Polygonum beyrichianum*, *Polygonum brachypodium*, *Polygonum chamusceanum*, *Polygonum meisnerianum*, *Polygonum meisnerianum* var. *jalapense*, *Polygonum meisnerianum* var. *setosum*

Persicaria minor (Rdesno menší)

synonyma: *Peutalis minus*, *Polygonum minus*

oblasti: Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Indiana, Irsko, Itálie, Massachusetts, New York, Nový Brunšvik, Ontario, Pennsylvania, Quebec, V Asie, Velká Británie, Vermont, Virginie

Roste v chladnějších částech severní polokoule. Patří mezi jednoletky. Lodyha je přímá až poléhavá, krátce větvená a vysoká 10 - 20cm. Listy jsou úzce kopinaté, zelené, obvykle s tmavou skvrnou, krátce řapíkaté, uťaté a ochlupené. Květenstvím je válcovitý řídkých lichoklas, květy jsou 5tičetné, okvětní lístky dlouhé 2 - 2,5mm, nazelenalé, na vrcholu bílé až bleděrůžové. Plodem je čočkovitá nažka.

Vyhovují mu okraje vod, ale i příkopy, atp.

Persicaria mitis (Rdesno řídkokvěté)

synonyma: *P. hydropiper* subsp. *mite*, *Polygonum hydropiper* var. *eglandulosa*, *Polygonum mite*

oblasti: Česká republika, Kavkaz, Slovensko

Roste mírném pásu Evropy, na Kavkaze, Himálaji a severozápadní Africe jako jednoletka. Dorůstá výšky (15 -) 35 - 60 (i 90)cm. Stonek je od báze větvený, holý, vzpřímený až vystoupavý. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 8cm, široké 0,3 - 2cm, na spodní straně na žilkách ochlupené a řapíky jsou krátké. Květenstvím je řídký zpravidla převislý klas nebo hrozen délky 1 - 5cm, vlastní 5tičetné květy mají průměr 1,5 - 2,5mm, 0,5 - 1mm stopku, korunní lístky jsou obkopinaté, zašpičatělé, 2řadé, nestejně, růžové, dlouhé 1,25 - 2,5cm a široké 0,5 - 1,5mm. Plodem je tupě 3hranná lesklá tmavě hnědá až téměř černá 2laločná až zploštělá nažka délky (1,5 -) 2,5 - 3mm a šířky 0,5 - 1,5mm.

Vyhovují mu obnažené vodní plochy, příkopy, atp.

Persicaria nepalensis

synonyma: *Cephalophilon nepalense*, *P. alata*, *P. punctata* var. *eciliata*, *P. punctata* var. *robustior*, *P. punctata* var. *tacubayana*, *Polygonum acre* var. *brachystachyum*, *Polygonum acre* var. *confertiflorum*, *Polygonum acre* var. *leptostachyum*, *Polygonum acre* var. *majus*, *Polygonum acre* var. *riparium*, *Polygonum alatum*, *Polygonum alatum* var. *nepalense*, *Polygonum antihaemorrhoidale* f. *riparium*, *Polygonum antihaemorrhoidale* var. *aquatile*, *Polygonum antihaemorrhoidale* var. *riparium*, *Polygonum nepalense*, *Polygonum nepalense* var. *adenothrix*, *Polygonum perforatum*, *Polygonum perforatum* var. *laevigatum*, *Polygonum punctatum* f.

longicollum, *Polygonum punctatum* f. *stipitatum*, *Polygonum punctatum* var. *alatum*, *Polygonum punctatum* var. *confertiflorum*, *Polygonum punctatum* var. *ellipticum*, *Polygonum punctatum* var. *littorale*, *Polygonum punctatum* var. *majus*, *Polygonum punctatum* var. *mexicanum*, *Polygonum punctatum* var. *parviflorum*, *Polygonum punctatum* var. *parvum*, *Polygonum punctatum* var. *riparium*, *Polygonum punctatum* var. *robustius*, *Polygonum punctatum* var. *tacubayanum*, *Polygonum punctatum* var. *typicum*, *Polygonum quadrifidum*, *Polygonum robustius*

oblasti: Afganistán, Afrika, Čína, Himálaj, Indie, Japonsko, Nepál, Pákistán

Roste v tropické Africe, Afganistánu, Himálaji, Pákistánu, Indii, Číně a Japonsku jako jednoletka. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 50)cm. Stonek je vystoupatý až vzpřímený a může být větvený. Listy jsou dlouhé 1,8 - 5cm, široké 0,5 - 3cm, spodní přisedlé a horní mají až 1cm stopku. Květenstvím je hlávka o průměru 6 - 7mm, zákravní list je přisedlý, vejčitý až kopinatý, dlouhý 0,65 - 1,25cm, široký 2,5 - 5mm, vlastní 4 - 5tičetné květy jsou světle růžově modré, průměru 2 - 2,5 (i 3)mm, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 2,5mm a široké 1 - 1,5mm. Plodem je 2 - 3hranná černá nažka délky 1,75 - 2mm a šířky 1,75 - 2mm.

Persicaria nogueirae

Persicaria odorata

synonyma: *Polygonum odoratum*

oblasti: Viktorie

Roste v Austrálii.

Persicaria orientalis (Rdesno východní)

synonyma: *Amblygonum orientale*, *Amblygonum orientale* var. *pilosum*, *Amblygonum pilosum*, *Goniaticum solitarium*, *Heptarina orientalis*, *Lagunea cochinchinensis*, *Lagunea orientalis*, *Lagunea orientalis* var. *pilosa*, *P. cochinchinensis*, *P. pilosa*, *P. tibetica*, *Polygonum amoenum*, *Polygonum cochinchinense*, *Polygonum cordobense*, *Polygonum orientale*, *Polygonum orientale* var. *discolor*, *Polygonum orientale* var. *pilosum*, *Polygonum pilosum*, *Polygonum torquatum*

oblasti: Česká republika, Čína, Indie, Japonsko, Kašmír, Malajsie, Pákistán

Roste v Indii, Pákistánu, Kašmíru, Malajsii, Japonsku a Číně jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 1,5m. Stonek je větvený a zpravidla ochlupený. Listy jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 3 - 20 (i 25)cm, široké 1 - 15cm a řapíky jsou dlouhé do 8cm. Květenstvím je hustý hrozen délky 2 - 15cm na 1 - 5cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, přisedlé, průměru 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou 2řadé, vejčitě kopinaté a zašpičatělé. Plodem je 2laločná ostře hranatá černá nažka délky 2 - 3mm a šířky 1,5 - 2,5mm.

Persicaria paraguayensis

oblasti: Paraguay

Persicaria pensylvanica (Rdesno pensylvánské)

synonyma: *P. mississippiensis*, *Polygonum mississippiense*, *Polygonum omissum*, *Polygonum*

pensylvanicum, *Polygonum pensylvanicum* var. *durum*, *Polygonum pensylvanicum* var. *eglandulosum*, *Polygonum pensylvanicum* var. *laevigatum*, *Polygonum pensylvanicum* var. *nesophilum*, *Polygonum pensylvanicum* var. *rosiflorum*

oblasti: Česká republika

Persicaria perfoliata

synonyma: *Ampelogonium perfoliatum*, *Echinocaulon perfoliatum*, *Polygonum arifolium* var. *perfoliatum*, *Polygonum perfoliatum*, *Tracaulon perfoliatum*, *Truellum perfoliatum*

Persicaria poiretii

synonyma: *Polygonum poiretii*, *Polygonum serratum*

Persicaria polymorpha

Persicaria polystachya (Rdesno mnohoklasé)

synonyma: *Aconogon polystachyum*, *Polygonum polystachyum*, *Rubrivena polystachya*

oblasti: Česká republika, Himálaj

Pochází z Himálaje.

Persicaria praetermissa

synonyma: *Polygonum praetermissum*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii.

Persicaria prostrata

synonyma: *Polygonum prostratum*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Persicaria pulchra

synonyma: *Polygonum pulchrum*

Persicaria punctata

synonyma: *Discolenta punctata*, *Polygonum acre*, *Polygonum acre* var. *aquatile*, *Polygonum antihaemorrhoidale* f. *aquatile*, *Polygonum barbatum*, *Polygonum epilobioides*, *Polygonum hydropiperoides* f. *leucochristanthum*, *Polygonum hydropiperoides* f. *strigosum*, *Polygonum hydropiperoides* var. *asperifolium*, *Polygonum hydropiperoides* var. *bushianum*, *Polygonum hydropiperoides* var. *digitatum*, *Polygonum hydropiperoides* var. *macerum*, *Polygonum*

hydropiperoides var. *macounii*, *Polygonum hydropiperoides* var. *sanibelense*, *Polygonum hydropiperoides* var. *strigosum*, *Polygonum mite*, *Polygonum punctatum*, *Polygonum punctatum* var. *aquatile*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Kanadě a USA v jako vzpřímená jednoduše větvená jednoletka nebo trvalka. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Povrch může být ochlupený. Listy jsou kopinaté až eliptické, špičaté nebo zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 1,5 - 7cm a špičaté 0,4 - 1,75cm. Květenstvím je chudý vrcholový vzpřímený hrozen délky 3 - 5 (i 7)cm, vlastní květy jsou přisedlé, 5tičetné, korunní lístky ve 2 řadách, nestejně, růžové, mírně obvejčité, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 1,5 - 2mm a široké 1 - 1,25mm. Plodem je hnědá 3hranná nažka délky 0,75 - 1 (i 1,25)mm a šířky 0,5mm.

Persicaria robustior

Persicaria sagittata

synonyma: *Helxine sagittatum*, *P. sagittata* var. *sieboldii*, *P. sieboldii*, *P. sieboldii* var. *brevifolia*, *Polygonum belophyllum*, *Polygonum paludosum*, *Polygonum sagittatum*, *Polygonum sagittatum* subsp. *sieboldii*, *Polygonum sagittatum* var. *boreale*, *Polygonum sagittatum* var. *gracilentum*, *Polygonum sagittatum* var. *paludosum*, *Polygonum sagittatum* var. *sibiricum*, *Polygonum sagittatum* var. *sieboldii*, *Polygonum sieboldii*, *Polygonum sieboldii* var. *pratense*, *Tasoba sagittata*, *Tracaulon sagittatum*, *Tracaulon sibiricum*, *Tracaulon sieboldii*, *Truellum paludosum*, *Truellum sagittatum*, *Truellum sibiricum*, *Truellum sieboldii*

Persicaria segetum

synonyma: *P. mexicana*, *Polygonum pennsylvanicum*, *Polygonum segetum*

Persicaria senegalensis

synonyma: *Polygonum sambescicum*, *Polygonum senegalense*, *Polygonum senegalense* var. *robustum*

oblasti: Alžírsko, Egypt, Izrael, Kréta, Maroko, Palestina, Řecko, Senegal, Sinajský poloostrov

Roste jako polokeř. Dorůstá výšky 0,8 - 1,5m. Stonky jsou vzpřímené a větvené. Listy jsou vejčitěkopinaté, špičaté, dlouhé (7-) 10 - 30cm a široké 1,5 - 7cm. Květenství je klasnaté, dlouhé 2 - 8cm a široké 1cm. Plodem je hnědočerná nažka délky 2 - 3mm.

Persicaria serrulata

synonyma: *Polygonum salicifolium*, *Polygonum serrulatoides*, *Polygonum serrulatum*

oblasti: Afrika, Austrálie, J Asie, Portugalsko, Řecko

Roste v teplejších oblastech zeměkoule. Může se jednat o jednoletku i trvalku. Lodyha je přímá až poléhavá a dorůstá délky do 1m. Listy jsou střídavé, úzce kopinaté, v horní části na okraji dlouze ochlupené, dlouhé 8 - 15cm, široké 1 - 2cm a u báze mají až 2cm botky. Květenstvím je terminální přetrhovaný klas délky 2 - 9cm, vlastní květy jsou růžové až bílé, 5tičetné a dlouhé 2 - 3mm. Plodem je černá nažka délky 2 - 2,5mm.

Vyhovují mu vlhká místa a okraje vod.

Persicaria setacea

synonyma: *Polygonum setaceum* var. *interjectum*, *Polygonum setaceum* var. *tonsum*

Persicaria setosula

synonyma: *Polygonum setosulum*

Persicaria sinuata

synonyma: *Polygonum sinuatum*

oblasti: Kašmír, Pákistán, Uttarákhand

Roste v Kašmíru v podobě rozkladité jednoletky. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Stonek je nahnědlý nebo načervenalý a v kolénkách dokáže znova zakořenit. Listy jsou zpeřeně laločnaté se 2 - 4mi laloky, obkopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,8 - 4,5 (i 5)cm, široké 0,75 - 2cm a koncový lalok je 3úhlý. Květenstvím je kompaktní vrcholová hlávka, má 1,8 - 5cm stopku, průměr 5 - 7mm, vlastní květy jsou 5tičetné, korunní lístky 2řadé, růžové, nestejně, obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 1,2 5 - 1,5mm a široké 0,75 - 1mm. Plodem je 3hranná černá nažka délky 1,5 - 2mm a šířky 1,5mm.

Persicaria stagnina

synonyma: *P. barbata* subsp. *stagnina*, *P. barbata* var. *stagnina*, *Polygonum barbatum* var. *stagninum*, *Polygonum conspersum*, *Polygonum stagninum*

oblasti: Bangladéš, Indie, Myanmar (Barma), Pákistán

Roste v Pákistánu, Indii, Bangladéši a Myanmu jako trvalka nebo jednoletka. Dorůstá výšky do 2m. Stonek je vzpřímený, v horní části ochlupený a na bázi dřevnatí. Listy jsou úzce kopinaté nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, oboustranně ochlupené, spodní strana více, dlouhé 7 - 12 (i 15)cm, široké 1 - 2,5 (i 3)cm, báze je široká a řapík jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je stopkatý klasnatý hrozen délky 7 - 10cm, vlastní květy jsou bílé, 5tičetné, průměru 2 - 3mm, mají 2 - 4mm stopku, korunní lístky obkopinatě obvejčité, dlouhé 2 - 4mm a široké 1 - 2mm. Plodem je 3hranná černá nažka délky 2,5 - 3mm a široké 2 - 2,5mm.

Persicaria strigosa

synonyma: *Polygonum bodinieri*, *Polygonum strigosum*, *Tracaulon strigosum*, *Truellum strigosum*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium

Roste v Austrálii.

Persicaria subsessilis

synonyma: *Polygonum subsessile*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Persicaria tenella

synonyma: *Polygonum minus* var. *subcontinuum*, *Polygonum tenellum*, *Polygonum tenellum* var. *kawagoeanum*

oblasti: Čína, Himálaj, Indie, Japonsko, Malajsie, Pákistán

Roste v Himálaji, Pákistánu, Indii, Číně, Japonsku a Malajsii jako malá jednoletka. Stonky jsou vzpřímené až vystoupavé a mohou být bohatě větvené. Větve jsou dlouhé 12 - 35cm. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 1 - 3,5 (i 4,5)cm, široké 0,5 - 1,5cm, báze je kulatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2 (i 3)mm. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní vzpřímený hrozen délky 1,5 - 3cm, vlastní květy jsou 5tičetné, růžově červené, průměru 1,5 - 2mm, mají 1,5 - 2mm stopku, korunní lístky 2řadé, obkopinatě vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 2,5mm a široké 0,5 - 1mm. Plodem je 2laločná až kulatá (i 3hranná) černá nažka délky 1,5mm a šířky 1mm.

Persicaria thunbergii

synonyma: *Helxine arifolia*, *P. hastato-triloba*, *P. sinica*, *Polygonum thunbergii*, *Tracaulon thunbergii*, *Truellum thunbergii*

Persicaria tinctoria

synonyma: *Ampelygonum tinctorium*, *Pogalis tinctoria*, *Polygonum tinctorium*

Persicaria tomentosa (Rdesno velkoplodé)

Persicaria virginiana

synonyma: *Polygonum virginianum*, *Tovara virginiana*

Persicaria vivipara

synonyma: *Bistorta americana*, *Bistorta insularis*, *Bistorta macounii*, *Bistorta vivipara*, *Bistorta vivipara* f. *ramosa*, *Bistorta vivipara* subsp. *fugax*, *Bistorta vivipara* subsp. *macounii*, *Bistorta vivipara* var. *roessleri*, *Colubrina vivipara*, *Polygonum bulbiferum*, *Polygonum macounii*, *Polygonum viviparum*, *Polygonum viviparum* var. *macounii*

Persicaria wallichii

synonyma: *Aconogonon polystachyum*, *Peutalis polystachya*, *Polygonum polystachyum*, *Reynoutria polystachya*

oblasti: Irsko

Další informace:

<http://botany.cz/cstest/persicaria-amphibia/>

<https://www.rostliny.net/>