

Andrachne telephioides

synonyma: *Andrachne asperula*, *Andrachne cretica*, *Andrachne nummulariifolia*, *Andrachne pojarkoviae*, *Andrachne rotundifolia*, *A. subsp. oreocretensis*, *A. var. brevifolia*, *A. var. rotundifolia*, *Andrachne virescens*, *Andrachne vvedenskyi*, *Eraclissa hexagyna*, *Telephioides procumbens*

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kazachstán, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Pákistán, Řecko, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Somálsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste od Kapverdských ostrovů přes střeozemí po Pákistán a na jih do Somálska jako trvalka. Stonek je bohatě olistěný a na bázi dřevnatí. Listy jsou mírně vejčité, zakulacené až přišpičaté, dlouhé 0,2 - 1 (i 1,2)cm, široké 1,5 - 6 (i 8)mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2 (i 4)mm. Kvete samostatnými samčími a samičími květy, samčí mají 1mm stopku, kališní lístky obvejčité, žlutozelené, dlouhé 1,3mm, korunní lístky jsou obkopynaté, bílé, dlouhé 1mm, samičí květy mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky obvejčité, dlouhé 2mm a tmavězelené s bělavými okraji. Plody jsou zploštělé, průměru 2 - 4mm a obsahují světle žlutohnědá semena velikosti 1,5 - 2mm.

<https://www.rostliny.net/>