

Spergularia maritima (Kuřinka obroubená)

synonyma: *Spergularia marginata*, *Spergularia media*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Austrálie, Černé moře, Česká republika, Illinois, Indiana, Jižní Amerika, JZ Asie, Kalifornie, Kolorado, Makaronésie, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, New York, Nové Mexiko, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Quebec, Rakousko, S Afrika, Severní Dakota, Slovensko, Střední Asie, Středozeří, Utah, Washington, Wyoming

Roste při pobřeží v Evropě (uvnitř izolovaně), severní, jižní a jihozápadní Africe, Kanárských ostrovech, střední Asii a zavlečena byla i do Severní Ameriky. Patří mezi trvalky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 25 (i 40)cm. Vytváří více lodyh, ta může být vystoupavá nebo přímá, květvená, na konci žláznatě ochlupená. Plísky mají trojúhelníkový tvar a jsou blanité. Vstříčné listy mají čárkovitý tvar, délku 0,6 - 3 (i 5)cm, šířku 1 - 2mm a jsou zlustlé. Kvete ve vidlanu světlorůžovými kvítky o průměru 0,8 - 1,2cm, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 5mm, 3žilné, korunní lístky jsou max. dlouhé jako kališní a narůžovělé. Plodem je tobolka délky 8mm s hladkými semeny průměru 1,5mm.

Vyhovují jí slané louky, blízkost minerálních pramenů, atp.

<https://www.rostliny.net/>