

## Rhynchospora colorata (Hrotnosemenka zbarvená)

synonyma: Cyperus kyllingia, Dichroma leucocephala, Dichromena ciliata, Dichromena colorata, Dichromena drummondiana, Dichromena glabra, Dichromena leucocephala, Dichromena leucocephalum, Kyllinga colorata, Kyllinga nemoralis, Rhynchospora drummondiana, Rhynchospora leucocephala, Rhynchospora persooniana, Rhynchospora stellata, Rhynchospora stellata f. intercedens, Schoenus coloratus, Schoenus stellatus

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Čína, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Japonsko, Jižní Karolína, Louisiana, Madagaskar, Malajsie, Mississippi, Pákistán, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Venezuela, Virginie

Roste v mokřadech latinské Ameriky jako trvalka, ale rozšířila se v teplých oblastech celého světa. Dorůstá výšky do 55cm. Pod zemí vytváří dlouhý plazivý oddenek o průměru 1,5mm. Stonek je ostře 3hranný a má průměr 1 - 1,5mm. Listy mají 1/2 délku stonku, jsou zelené až šedozelené, mohou být mírně kýlnaté, dlouhé do 20cm, široké 2 - 4mm, pochva je světle zelená nebo šedá, s načervenalou žilnatinou a dlouhá do 7cm. Květenství je kompaktní, délky 0,7 - 1cm, tvořené více než 100 bělavými nebo nahnědlými klásky ve spirále, délkou 2,5 - 3 (i 3,3)mm, šířky 1,5mm, listeny jsou 3 - 4 a mají délku až 20cm.

<https://www.rostliny.net/>