

Acorus calamus (Puškvorec obecný)

čeleď: Acoraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z tropické Asie, pak zdomácněl v Evropě a Severní Americe. Patří mezi trvalky. Pod vodou vytváří plazivý vodorovný oddenek délky do 50cm a průměru 1 - 1,5 (i 3)cm. Dorůstá výšky (0,6 -) 0,7 - 1,2 (i 1,6)m. Lodyha je 3hranná. Listy jsou dvouřadé, ploché, čárkovité až mečovité, na okraji zpravidla zvlněné, dlouhé 0,55 - 1 (i 1,2)m a široké 0,8 - 1,5 (i 2,5)cm. Květenstvím je 5 - 6,5 (i 9)cm dlouhá a 1 - 1,4cm široká palice se zelenými květy. Semena mají velikost 2mm. Je sladce aromatický. U zahradních rybníčků je velmi vhodný ke zpevnování břehů a využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *americanus*/A. *americanus* - Aljaška, Kanada a sever USA
- var. *angustatus*/A. *latifolius*/A. *triqueter* - Čína, Japonsko, Tchaj-wan
- 'Variegatus' - listy panašované, podélně béžově bílé pruhované, na jaře narůžovělé

Vyhovují mu stojaté nebo i tekoucí vody a bahnitě půdy nebo zaplavované půdy. Roste v jakékoliv zamokřené půdě.

Množí se dělením oddenků.

<https://www.rostliny.net/>