

Equisetum arvense (Přeslička rolní)

synonyma: Equisetum calderi, Equisetum saxicola

čeleď: Equisetaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Kyrgyzstán, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Skandinávie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, V Asie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Cirkumboreální, Eurasie. Základ rostliny tvoří oddének ze kterého vyrůstají žlutohnědé nevětvené lodyhy vysoké 0,1 - 0,2 (i 1)m. V průřezu jsou žebra téměř hladká. Na vrcholku se nachází výtrusnicový klas. Po vypadnutí výtrusnic stonek usychá a namísto ní vyrůstá letní zelená lodyha s přesličkovitými listy o výšce 20 - 50 (i 60)cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. alpestre

Kromě dostatku vody nemá specifické nároky na pěstování. Lepší je ale kyselější půda. Vyskytuje se na okrajích polí, lesů, naspů, železnic, příkopů, atp.

<https://www.rostliny.net/>