

Lindernia crustacea

synonyma: *Antirrhinum hexandrum*, *Buchnera capillaris*, *Gratiola aspera*, *Gratiola lucida*, *Morgania lucida*, *Pyxidaria crustacea*, *Tittmannia scabra*, *Torenia crustacea*, *Torenia flaccida*, *Torenia scabra*, *Vandellia alba*, *Vandellia bodinieri*, *Vandellia crustacea*

čeleď: Linderniaceae

oblasti: Afrika, Alabama, Arkansas, Austrálie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Himálaj, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Pákistán, Portoriko, Severní Karolína, Texas

Roste v tropické a subtropické Asii, Polynésii, Austrálii, tropické Africe a Americe jako vzpřímená až rozkladitá či plazivá větvená jednoletka. Dorůstá délky 5 - 20cm. Stonek v kolénkách dokáže znovu zakořenit. Listy jsou široce eliptické až široce vejčité nebo kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1,7 (i 3)cm, široké 0,3 - 1,5cm, žilnatina je zpeřená a řapíky jsou dlouhé 1 - 7mm. Kvete samostatnými květy na 0,6 - 2cm stopce, kalich je trubkovitý, dlouhý 3 - 4mm (za plodu 4 - 6mm), krátce 5tilaločný (max. 1/3 délky trubky), koruna je modrá až růžově fialová, velikosti 0,65 - 1,1cm a spodní pysk má 3 laloky. Plodem je úzce obvejčitá až kulovitá zašpičatělá světle hnědá tobolka velikosti 3,5mm a obsahuje světle oranžová semena velikosti 0,5mm.

<https://www.rostliny.net/>