

## Lindernia procumbens (Puštička rozprostřená)

synonyma: *Lindernia erecta*, *Lindernia pyxidaria*, *Vandellia erecta*

čeleď: Linderniaceae

oblasti: Afganistán, Altaj, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Čína, Havajské ostrovy, Himálaj, Indie, Indočína, Írán, Itálie, Japonsko, Kavkaz, Malajsie, Německo, Pákistán, Pamír, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Turkestán, V Evropa, Virginie , Z Sibiř

Roste od střední a jižní Evropy po Japonsko jako vzpřímená nebo vystoupavá jednoletka. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 20 (i 25)cm. Stonek je 4hranný. Listy jsou přisedlé, vstřícné, eliptické až vejčité kopinaté, dlouhé (0,7 -) 1 - 2 (i 2,5)cm, široké 0,3 - 1cm a žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek. Kvete samostatnými květy v paždí listů na (0,5 -) 0,8 - 1,8 (i 2)cm dlouhé stopce, kalich je hluboce 5tilaločný, velikosti 2,5 - 3,5mm, laloky jsou čárkovité, koruna je nepatrně 2pyská, bílá s načervenalými okraji, velikosti 3 - 6mm a spodní pysk je 3laločný. Plodem je eliptická tobolka délky 3 - 4mm, šířky 2,5 - 3mm a obsahuje žlutá podlouhlá semena délky 0,3mm a šířky 0,15mm. Patří mezi ohrožené druhy C1.

Vyhovují ji bahnitá nebo písčité obnažená dna.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>