

Puccinellia distans (Zblochanec oddálený)

synonyma: *Aira aquatica* var. *distans*, *Aira miliacea*, *Atropis capillaris*, *Atropis distans*, *Atropis distans* f. *limosa*, *Atropis distans* var. *glauca*, *Atropis distans* var. *limosa*, *Atropis distans* var. *tenuis*, *Atropis fontqueri*, *Atropis glauca*, *Atropis intricata*, *Atropis limosa* f. *cumana*, *Atropis picbaueri*, *Atropis pulvinata*, *Atropis sevangensis*, *Atropis suecica*, *Atropis suecica* var. *capillaris*, *Catabrosa distans*, *Festuca capillaris*, *Festuca distans*, *Festuca distans* f. *pallens*, *Festuca distans* var. *capillaris*, *Festuca distans* var. *limosa*, *Festuca distantis* f. *pallens*, *Festuca limosa*, *Glyceria capillaris*, *Glyceria distans*, *Glyceria distans* f. *montana*, *Glyceria distans* f. *tenuis*, *Glyceria distans* subsp. *parlatorei*, *Glyceria distans* var. *angustifolia*, *Glyceria distans* var. *glauca*, *Glyceria distans* var. *parlatorei*, *Glyceria distans* var. *pulvinata*, *Glyceria distans* var. *reptans*, *Glyceria distans* var. *tenuiflora*, *Glyceria distans* var. *tenuis*, *Glyceria intermedia*, *Glyceria intricata*, *Glyceria maritima* var. *virescens*, *Glyceria parlatorei*, *Glyceria reptans*, *Glyceria retroflexa*, *Heleocholoa distans*, *Hydrochloa capillaris*, *Hydrochloa distans*, *Molinia capillaris*, *Molinia distans*, *Panicularia distans*, *Phippsia capillaris*, *Phippsia capillaris* subsp. *pulvinata*, *Phippsia coarctata*, *Phippsia distans*, *Phippsia limosa*, *Phippsia nutkaensis* subsp. *borealis*, *Poa caduca*, *Poa distans*, *Poa distans* var. *minor*, *Poa distans* var. *obtusa*, *Poa miliacea*, *Poa retroflexa*, *Poa retrofracta*, *Poa salina*, *Puccinellia capillaris*, *Puccinellia capillaris* subsp. *pulvinata*, *Puccinellia coarctata*, *P. f. montana*, *P. f. tenuis*, *P. subsp. borealis*, *P. subsp. glauca*, *P. subsp. limosa*, *P. subsp. sevangensis*, *P. var. angustifolia*, *P. var. halophila*, *P. var. picbaueri*, *P. var. poiformis*, *P. var. retroflexa*, *P. var. tenuis*, *Puccinellia embergeri*, *Puccinellia filiformis*, *Puccinellia fontqueri*, *Puccinellia glauca*, *Puccinellia intricata*, *Puccinellia limosa*, *Puccinellia limosa* f. *cumana*, *Puccinellia limosa* f. *pallens*, *Puccinellia parlatorei*, *Puccinellia pseudoconvoluta*, *Puccinellia pulvinata*, *Puccinellia retroflexa*, *Puccinellia retroflexa* subsp. *borealis*, *Puccinellia retroflexa* var. *virescens*, *Puccinellia sevangensis*, *Puccinellia suecica*, *Puccinellia suksdorfii*, *Sclerochloa distans*, *Sclerochloa multiculmis*, *Sclerochloa multiculmis* subsp. *distans*, *Sclerochloa multiculmis* var. *distans*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alžírsko, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čína, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Dakota, Kalifornie, Kašmír, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Korea, Labrador, Maine, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Mongolsko, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Švýcarsko, Tunisko, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Sibiř, Západní Virginie

Pochází z Evropy, severní Afriky a Asie a roste i v Severní Americe. Patří mezi víceletky. Roste v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 50 (i 60)cm. Stébla jsou mírně zploštělá. Listy mají výrazné žebrování, mohou být žlábkovité, dlouhé do 10cm, široké 2 - 4mm a mají tupý 2mm jazýček. Kvete v řídké (po odkvětu skloněné) latě, klásky bývají žlutozelené, mají délku 3 - 7mm a tvoří je (3 -) 4 - 6 (i 7) květů. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovuje mu vlhko a lehké zasolené půdy.