

Beckmannia eruciformis (Housenkovec zduřelý)

synonyma: Beckmannia borealis, Beckmannia cruciformis, B. subsp. borealis, B. var. uniflorus, Bruchmannia eruciformis, Cynosurus eruciformis, Joachimia phalaroides, Panicum cruciforme, Paspalum eruciforme, Phalaris eruciformis

čeleď: Poaceae

oblasti: Chorvatsko, Česká republika, Írán, Itálie, JV Evropa, Kazachstán, Malá Asie (Anatolie), Slovensko, V Evropa, V Středozeří, Z Sibiř

Roste v západní Asii, Turecku, Sibiři, Kazachstánu, jihovýchodní, východní a střední Evropě. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,5m. V přízemních uzlinách stébla dokáže zakořenit a fertilní bývají na bázi cibulkatě ztlustlá. Listy vyrůstají z hladké 5 - 6mm pochvy, délka čepele je až 50cm, šířka 0,4 - 1cm a má světlezelenou barvu. Kvete v paklasu délky 18 - 25cm, je složený z válcovitých zploštělých 2květých klásků o délce 1 - 3cm a plevy jsou silně nafouklé. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovují mu mokré louky, příkopy, přehy, slaniska, atp. Půda by měla být bahnitá, v létě vysychající, hlinitá až jílovitá se zásaditým pH. Může být i zasolená.

Množí se semeny nebo vegetativně.

<https://www.rostliny.net/>